

Prévision agrométéorologique pour septembre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 16.09.2019 *Брой:* 9/2019



Début septembre, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps sec, chaud et, en de nombreux endroits des zones de plaine, chaud, ce qui accélérera la progression des stades finaux de développement des cultures de plein champ tardives. Au cours de la première semaine du mois, les hybrides de maïs mi-tardifs atteindront la maturité cireuse et pleine, tandis que les hybrides tardifs seront au stade laiteux et à la transition vers la maturité cireuse.

La plupart des jours de la première décade, les conditions resteront favorables à la récolte du tournesol et à la libération des surfaces ensemencées avec des hybrides de maïs plus précoces. En fin de décade, une baisse des températures et un changement des conditions agrométéorologiques sont prévus. Les précipitations attendues, après la sécheresse qui s'est intensifiée en fin d'été, amélioreront l'état des couches supérieures du

sol, ce qui est un prérequis pour un travail du sol pré-semis et un semis de colza d'hiver de meilleure qualité. Les périodes agrotechniques optimales pour le semis du colza vont jusqu'à la fin de la deuxième décennie de septembre.

Au cours des deuxième et troisième décennies, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par des températures proches des normes climatiques. Mi-septembre, les hybrides de maïs tardifs achèveront leur développement ; le riz sera en maturité cireuse et pleine, et la betterave sucrière atteindra sa maturité technique. Durant la troisième décennie, plus tôt que les dates habituelles, les cépages de vin tardifs atteindront leur maturité technologique. Le coton sera au stade de maturation.

Les précipitations prévues durant la seconde moitié de la deuxième décennie et le début de la troisième décennie revêtiront une importance majeure pour la levée normale du colza. Dans les régions où l'humidité n'est pas un facteur limitant, pour les cultures semées dans la période agrotechnique, le stade de levée sera observé fin septembre. Au stade de levée, des dégâts importants sur le colza sont causés par l'altise d'hiver du colza (adultes) et la tenthrède du colza (fausses chenilles), ce qui nécessite une surveillance durant ce stade pour déterminer l'apparition et la densité de population des ravageurs. Lorsque la densité dépasse le seuil de nuisibilité économique (SNE pour l'altise d'hiver du colza - 2 altises par m² ; SNE pour la tenthrède du colza 2-3 fausses chenilles par m²), un traitement est obligatoire.

En septembre, pour les cultures légumières de production de plein champ tardive, les traitements de protection des plantes contre les chenilles de la troisième génération de la noctuelle de la tomate ne doivent pas être sous-estimés, car elles causent des dégâts et détériorent la qualité du rendement légumier.

Au cours de la troisième décennie du mois, dans les champs plus élevés, la possibilité de formation de gelées ne peut être exclue, ce qui doit être pris en compte lors de la récolte des cultures légumières sensibles au gel (tomates, poivrons).

Source : NIMH