

'Noctuelle de la capsule du cotonnier (*Helicoverpa armigera* L.)'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 17.09.2019 Брой: 9/2019



La noctuelle de la tomate (***Helicoverpa armigera* L.**) a montré une nocivité croissante ces dernières années. Elle est capable d'attaquer plus de 120 espèces de plantes cultivées et sauvages. Dans les cultures maraîchères, elle cause des dégâts de vers sur les fruits du poivron, de la tomate et de l'aubergine.

Les larves sont le stade nuisible ; elles rongent les feuilles, les bourgeons et les fleurs, et à un stade plus avancé, elles attaquent les fruits verts, y pénètrent et se nourrissent de leur contenu. Les mesures de lutte contre la noctuelle sont efficaces lorsqu'elles sont dirigées contre les jeunes larves du deuxième au troisième stade. Afin de couvrir la génération, il est nécessaire d'effectuer deux traitements à un intervalle de 8 à 10 jours, selon les conditions météorologiques et l'effet rémanent de l'insecticide.

Stratégie de lutte contre le ravageur

Inspections régulières des champs. Contrôle de la végétation adventice, où les adultes se nourrissent, pondent leurs œufs et où les jeunes larves se nourrissent avant de passer sur les plantes cultivées.

Produits phytosanitaires autorisés

Coragen 20 SC 14–20 ml/da ; Avant 150 EC 25 ml/da ; Altacor 35 WG 8–12 g/da ; Ampligo 150 ZC 40 ml/da ; Affirm 095 SG 150 g/da ; Nurelle D / Sanba / Chlorsirin 550 EC 50 ml/da, etc.

En production biologique de cultures maraîchères, Rapax (*Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*, souche EG 2348) peut être utilisé à une dose de 100–200 ml/da, homologué pour la tomate, le poivron et l'aubergine, et Cyneis 480 SC (Spinosad) 12,5–30 ml/da. Parmi les mesures de limitation des noctuelles aériennes, on peut également inclure le parasitoïde des œufs *Trichogramma* ; il est élevé en masse à l'avance en conditions de laboratoire et lâché sur les zones menacées.