

Activités de protection des plantes en automne dans le verger

Автор(и): д-р Елена Манчева, Виола АЕ – Сливен

Дата: 26.09.2019 Брой: 9/2019



En septembre, la sécheresse estivale-automnale se poursuit. Elle se fait sentir plus distinctement dans les régions orientales, où la moyenne mensuelle des précipitations s'élève à 25-30 l/m². Dans la partie occidentale du pays, elle ne dépasse pas 40-50 l/m².

Certaines années, la moyenne mensuelle des précipitations atteint entre 5 et 10 l/m². La température moyenne quotidienne est de 15 à 20 °C, et après le 20 septembre, elle diminue de près de 2-3 °C. La température quotidienne la plus élevée atteint 28-32 °C, et la température moyenne la plus basse est comprise entre 3 et 8 °C.

Dans ces conditions climatiques, l'environnement est favorable à l'apparition et à la multiplication d'insectes et d'acariens multivoltins. Ils développent leurs dernières générations, et la densité de ces populations déterminera en grande partie le niveau des dégâts l'année suivante. Au cours du mois, des conditions sont créées pour la formation d'une abondante rosée, qui est une cause d'infections de la tavelure du pommier et du poirier, du mildiou sur les tomates tardives, et d'autres.

Pommes et poires

Au début du mois, le vol du carpocapse (fin de la deuxième génération et partiellement de la troisième) doit être surveillé et des traitements effectués si nécessaire.

Après une inspection minutieuse et la détection d'infections tardives de la tavelure, ainsi que pour lutter contre les maladies qui se développent pendant le stockage des produits, des traitements sont effectués avec Topsin M 70 WG - 0,1% ou Top plus 70 WP - 0,1%. Pour un bon stockage des pommes et des poires et pour réduire les pourritures et la décomposition pendant le stockage, il est également conseillé d'effectuer un traitement post-récolte avec Topsin M 70 WG - 0,120%. Après la pulvérisation, les fruits sont laissés à sécher puis disposés dans des chambres froides ou des locaux de cave profonds et frais.

Vignobles

Durant cette période, la pourriture grise cause des dégâts importants à la vigne dès le début de la coloration des baies jusqu'à la consommation. Par conséquent, par temps humide et frais en septembre, des traitements sont effectués avec Topsin M 70 WG - 0,2%. À ce moment, les adultes de la troisième génération de l'eudémis de la vigne sont également en vol. Les chenilles endommagent les baies de raisin mûrissantes ou déjà mûres. Pour lutter contre ce ravageur, un pyréthrianoïde homologué est ajouté à la solution de pulvérisation fongicide.

Les vignes d'un an sont recouvertes de terre sur 3-5 cm au-dessus du point de greffe. Cette opération est effectuée fin septembre.

Conformément à la Loi sur la protection des végétaux, les agriculteurs sont tenus d'utiliser uniquement des produits phytopharmaceutiques autorisés pour la culture et le ravageur concernés, et au dosage correspondant.

Les produits phytopharmaceutiques autorisés à la commercialisation sont publiés sur le site web de l'Agence bulgare de sécurité alimentaire à l'adresse électronique : <http://www.babh.government.bg/> ou dans la « Liste des produits phytopharmaceutiques autorisés à la mise sur le marché et à l'utilisation » 2019.

Les produits phytopharmaceutiques doivent être achetés uniquement auprès de sociétés commerciales détenant une autorisation !

Attention ! Lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, toutes les exigences en matière de sécurité au travail, de protection des colonies d'abeilles contre l'empoisonnement et de protection de l'environnement contre la pollution doivent être respectées !