

Prévisions agrométéorologiques pour la fin septembre et le début octobre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.09.2019 *Брой:* 9/2019



Suite à l'aggravation de la sécheresse, les précipitations tombées au cours de la période de sept jours écoulée ont entraîné une amélioration de l'état hydro-physique du sol dans la couche superficielle. À la fin de l'été, le sol sec et compacté a entravé, et dans une partie des régions du nord-est (station agrométéorologique de Silistra) a arrêté l'exécution du labour profond et du travail du sol avant semis des parcelles destinées aux semis de colza et de cultures céréalières d'hiver. Pour cette raison, dans de nombreux endroits, les délais agrotechniques pour le semis du colza d'hiver – une culture exigeant un travail précis des champs – ont été dépassés.

Pendant la plupart des jours de la période (fin septembre–début octobre), les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps relativement sec et chaud pour la saison. Les températures prévues, avec des

valeurs maximales pouvant atteindre localement 30-31°C, accéléreront les processus de maturation des cultures agricoles tardives et contribueront à la synthèse de plus de sucres dans les fruits des variétés tardives d'arbres fruitiers et de raisins. Durant cette période, une grande partie des cépages de vin rouge atteindra la maturité technologique, et les variétés d'arbres fruitiers d'automne – la maturité de récolte. À la fin du mois de septembre et au début du mois d'octobre, les vergers de poiriers doivent être surveillés pour l'apparition d'un ravageur dangereux – le charançon du bourgeon du poirier. La lutte contre ce ravageur est menée contre les individus adultes au début de l'automne.

Au cours de la prochaine période, les conditions permettront la mise en œuvre des activités agrotechniques saisonnières. La période coïncide avec le moment optimal pour le semis des cultures céréalières d'hiver dans les champs élevés. Au début du mois d'octobre, les délais agrotechniques pour le semis du blé dans le nord de la Bulgarie commencent.

Source : NIMH