

Prévision agrométéorologique pour octobre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 11.10.2019 *Брой:* 10/2019



En octobre, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par des températures autour et au-dessus des normes climatiques et par des précipitations proches des moyennes mensuelles.

Au début du mois d'octobre, les températures supérieures à la normale prévues, avec des valeurs maximales allant jusqu'à 29-30°C, accéléreront la maturation des variétés tardives d'arbres fruitiers et de raisins et seront une condition préalable à la formation d'un rendement supplémentaire pour les cultures légumières tardives.

Après le temps anormalement chaud de la seconde moitié de la première décade, une normalisation des conditions thermiques est attendue. Les précipitations de fin septembre et les pluies attendues au cours des dix premiers jours d'octobre fourniront l'humidité nécessaire à la levée des cultures semées au début de l'automne.

La sécheresse de la fin de l'été dans de nombreuses régions du pays a retardé le travail du sol avant le semis des parcelles destinées aux cultures d'automne. Pour cette raison, dans une grande partie des régions de plaine, les dates agrotechniques de semis du colza d'hiver ont été dépassées. Octobre est la période optimale pour le semis des cultures céréalières d'hiver. La première décade correspond à la période agrotechnique pour le semis du blé dans le nord de la Bulgarie, du 15 au 25 octobre dans le sud de la Bulgarie, et à la fin du mois – le long de la côte de la mer Noire.

Pendant la plupart des jours des deuxième et troisième décades, le développement des peuplements semés de colza et de cultures céréalières d'hiver se poursuivra à un rythme modéré, dans des conditions thermiques proches de la normale. Les précipitations prévues dans la seconde moitié d'octobre devraient améliorer le niveau des réserves en eau du sol dans la couche de 50 cm et les conditions du déroulement des phases initiales de végétation des cultures d'automne. À la fin du mois, pour le blé, selon les dates de semis, les stades suivants seront observés : levée, troisième feuille et début du tallage, principalement dans les peuplements semés début octobre. Pour le colza, la formation des feuilles sera en cours. À la fin du mois d'octobre, dans les peuplements de colza les plus précoces, semés en septembre, le début du stade de formation de la rosette sera observé.

En octobre, les cultures d'automne sont attaquées par un certain nombre de ravageurs. Dans les cultures céréalières d'hiver, l'activité nuisible du campagnol commun, de la chrysomèle des céréales et des mouches des céréales doit être surveillée, et lorsque la densité des ravageurs dépasse le seuil de nuisibilité économique (SNE), un traitement en temps opportun doit être effectué. Pour le campagnol commun, le SNE est de 2 colonies actives par décare ; pour la chrysomèle des céréales – 3 larves/m².

Pour le colza, des prospections pour détecter la présence de l'altise du chou (adultes) et de la tenthrède de la rave (fausses chenilles) doivent être réalisées au cours du mois, et lorsque leur nombre dépasse le SNE, une pulvérisation insecticide doit être effectuée.

Source : NIMH