

# Prévisions agrométéorologiques pour la fin du mois d'octobre

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 25.10.2019 Брой: 10/2019



Durant la plupart des jours de la période à venir, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps sec et chaud pour la saison, ce qui entraînera un approfondissement du déficit hydrique dans les cultures d'automne. Dans la plupart des régions du pays, notamment dans le nord-ouest de la Bulgarie – les stations agrométéorologiques de Kneja et Băzovec, dans la plaine de Sofia – la station agrométéorologique de Lozen, et dans la plaine de Thrace supérieure – les stations agrométéorologiques de Plovdiv, Pazardzhik et Sliven, les réserves en eau du sol dans la couche de 50 cm sont faibles, inférieures à 45–50% de la capacité au champ, et par endroits complètement épuisées. Dans ces zones, le déficit hydrique restreindra et retardera le développement du blé, de l'orge et du colza d'hiver.

Les précipitations prévues en fin de période n'auront pas de signification économique. Dans certaines zones de la plaine du Danube, il existe un risque réel de dessiccation d'une partie des cultures céréalières d'hiver germées.

Dans le contexte de la sécheresse accentuée, il existe des exceptions dans les régions extrêmes du sud et du sud-est, où durant la première décade d'octobre des quantités de précipitations plus importantes sont tombées – plus de 25–30 l/m<sup>2</sup> – Sandanski, Kardzhali, Haskovo, Elhovo et Burgas. Elles ont amélioré les conditions pour les semis et pour le déroulement des stades initiaux de végétation des cultures d'automne semées.

Au cours de la prochaine période, dans les régions où l'humidité n'est pas un facteur limitant, on observera la levée et le début de la formation des feuilles chez le blé et l'orge. Une partie des cultures dans les régions du sud, principalement celles semées début octobre, entrera au stade de la troisième feuille – la station agrométéorologique de Karnobat.

Durant la dernière semaine d'octobre, les conditions seront favorables pour le nettoyage des parcelles des cultures sarclées tardives et pour la récolte des variétés fruitières d'automne-hiver. La période est propice à la plantation des framboisiers et des cassissiers.

*Source NIMH*