

Prévisions agrométéorologiques pour décembre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.12.2019 Брой: 12/2019



Les températures supérieures à la normale et l'amélioration des réserves en eau du sol durant la seconde moitié du mois de novembre ont prolongé la végétation automnale du blé, de l'orge et du colza. Durant la première décade de décembre, les conditions agrométéorologiques seront très dynamiques. Le refroidissement prévu vers le milieu de la période entraînera un ralentissement et, dans certaines parties du nord de la Bulgarie et des régions occidentales, où des précipitations, y compris de la neige, sont attendues – un arrêt des processus de végétation des céréales d'hiver et du colza. À la fin de la première décade, une hausse des températures est prévue, mais leurs valeurs moyennes journalières resteront inférieures au minimum biologique requis pour la végétation des cultures semées en automne.

Durant la plupart des jours des deuxième et troisième décades, les températures prévues, autour et au-dessus des normes climatiques, maintiendront les céréales d'hiver en dormance relative dans la plus grande partie du pays. Des exceptions sont possibles pour le blé et l'orge dans les régions les plus méridionales et le long de la côte de la mer Noire. Durant les périodes relativement plus chaudes de la seconde moitié du mois dans ces zones, il est probable que des conditions soient créées pour une reprise de courte durée des processus de végétation dans les cultures semées en automne, mais aucun changement dans les stades phénologiques des cultures n'est attendu.

En raison de la sécheresse automnale prolongée, les cultures entreront en hiver à des stades différents. Dans la plupart des régions du pays, à l'exception de certains endroits dans le sud-est de la Bulgarie, le déficit hydrique du sol a retardé la végétation du blé, de l'orge et du colza d'hiver. À la fin de l'automne, le stade de croissance prédominant des céréales d'hiver est la troisième feuille. Une partie des peuplements de blé, principalement dans les régions du nord-ouest (stations agrométéorologiques de Băzovec, Pavlikeni), sont au stade de la levée et du développement foliaire précoce (1–2 feuilles). Le blé dans les régions orientales du pays est au stade du tallage, stade dans lequel les céréales d'hiver hivernent avec succès. Pour le colza, en raison du déficit hydrique durant la végétation automnale, seule une partie des peuplements est au stade de la rosette – le stade approprié pour l'hivernage.

En décembre, les températures minimales prévues pouvant atteindre moins 11°C, dans des conditions sans couverture neigeuse et avec une persistance plus prolongée, seront critiques pour les céréales d'hiver au stade de la levée et du développement foliaire précoce, et pour les peuplements de colza qui n'ont pas réussi à former une rosette.

Suite aux précipitations significatives durant la troisième décade de novembre, qui ont dépassé 50–60 mm en de nombreux endroits du sud de la Bulgarie (Sandanski, Pazardzhik, Plovdiv, Haskovo, Kardzhali, Chirpan), il y a eu une augmentation substantielle des réserves en eau dans les couches supérieures du sol et, dans la plupart des régions arables du pays, le déficit hydrique dans les cultures semées en automne a été comblé. Les précipitations attendues en décembre, autour de la norme mensuelle, augmenteront encore les réserves en eau du sol dans la couche de 100 cm.

Source : NIMH