

Nous accueillons janvier avec des températures minimales très basses

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.01.2020 Брой: 1/2020



Les températures minimales prévues au cours du mois, pouvant descendre jusqu'à -15 °C, dans des conditions sans couverture neigeuse et avec une persistance plus prolongée, seront critiques pour les cultures céréalières d'hiver qui n'ont pas réussi à entrer dans le stade du tallage durant leur végétation automnale. Ces valeurs seront également critiques pour les peuplements de colza d'hiver sous-développés qui, en raison de la sécheresse automnale, n'ont pas formé de rosette (de 7 à 8 feuilles) – le stade auquel les plantes hivernent avec succès.

Les températures élevées de décembre ont prolongé la végétation des cultures semées à l'automne. En raison des températures supérieures à la normale, certaines des cultures céréalières d'hiver levées tardivement dans

l'ouest de la Bulgarie, aux stations agrométéorologiques de Kneja, Sofia, Kyustendil, ont formé 2 à 3 feuilles.

En janvier, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par des températures autour et au-dessus des normes climatiques, ce qui maintiendra les cultures semées à l'automne et les plantations pérennes en dormance. Les cultures céréalières d'hiver aborderont le mois le plus froid de l'année dans différents stades phénologiques – une conséquence de la sécheresse automnale prolongée et des semis retardés. Une part significative des peuplements hivernera au stade trois feuilles. Au stade du tallage, le stade approprié pour l'hivernage, se trouve une grande partie des peuplements de blé dans l'est de la Bulgarie, à Silistra, Glavinitsa, Tsarev Brod, Dolni Chiflik, Yambol, Karnobat. Affaiblis, aux stades de la levée et de la formation initiale des feuilles, se trouvent certaines des cultures céréalières d'hiver semées tardivement (semées en novembre) en certains endroits de la plaine danubienne, aux stations agrométéorologiques de Nikolaevo, Pavlikeni.

Les températures minimales prévues au cours du mois, pouvant descendre jusqu'à -15 °C, dans des conditions sans couverture neigeuse et avec une persistance plus prolongée, seront critiques pour les cultures céréalières d'hiver qui n'ont pas réussi à entrer dans le stade du tallage durant leur végétation automnale. Ces valeurs seront également critiques pour les peuplements de colza d'hiver sous-développés qui, en raison de la sécheresse automnale, n'ont pas formé de rosette (de 7 à 8 feuilles) – le stade auquel les plantes hivernent avec succès.

Les précipitations attendues en janvier, autour et en dessous de la norme, augmenteront les réserves en humidité du sol dans les couches de 50 cm et 100 cm. Au début de l'hiver, dans la plupart des régions du pays, le niveau des réserves en humidité dans la couche de sol d'un mètre est exceptionnellement bas pour la saison. En certains endroits de l'ouest de la Bulgarie, aux stations agrométéorologiques de Kneja, Kyustendil, et dans certaines régions de l'est, aux stations agrométéorologiques de Razgrad, Sliven, il est inférieur à 65% de la capacité au champ (CC).

En janvier, des conditions plus favorables pour réaliser la taille d'hiver dans les vignobles et les vergers se présenteront durant la seconde moitié du mois.

Source : NIMH

