

Prévisions agrométéorologiques pour la mi-janvier

Автор(и): Растителна защита
Дата: 13.01.2020 Брой: 1/2020



Le temps relativement sec prévu pendant cette période sera propice à l'exécution de labours profonds et de travaux inter-rangs dans les vignobles et les vergers, ce qui détruit une grande partie des stades hivernants de nombreux ravageurs (charançons, papillons de nuit, tenthrèdes des fruits, etc.). Les températures diurnes positives prévues permettront la mise en œuvre des pulvérisations hivernales de protection des plantes dans les vergers.

Début janvier, dans certaines localités de l'ouest de la Bulgarie (Vidin, Knezha, Dragoman, Sofia, Kyustendil) et dans la plaine de Thrace (Plovdiv, Chirpan), des températures minimales d'environ moins 10-11°C ont été enregistrées. Ces valeurs, dans des conditions sans couverture neigeuse et avec une persistance plus

prolongée, sont dangereuses pour les cultures d'hiver semées tardivement qui hivernent aux stades de levée et de développement foliaire initial.

Après la brève vague de froid, les conditions agrométéorologiques vont évoluer au cours de la période suivante. Des températures supérieures à la normale sont prévues jusqu'à la mi-janvier, mais leurs valeurs quotidiennes moyennes resteront inférieures au minimum biologique requis pour la reprise des processus végétatifs dans les cultures céréalières d'hiver, et les peuplements resteront en état de dormance.

Aucune précipitation significative n'est prévue pendant cette période, et le niveau des réserves en eau du sol pour les cultures céréalières d'hiver dans les couches de 50 et 100 cm restera exceptionnellement bas pour la saison – dans certaines régions de l'est, en dessous de 60% de la capacité au champ. Au début de l'hiver, les années sans sécheresse automnale, les réserves en eau du sol dans la couche de 100 cm atteignent généralement des niveaux proches de la capacité au champ.

Le temps relativement sec prévu pendant cette période sera propice à l'exécution de labours profonds et de travaux inter-rangs dans les vignobles et les vergers, ce qui détruit une grande partie des stades hivernants de nombreux ravageurs (charançons, papillons de nuit, tenthrèdes des fruits, etc.). Les températures diurnes positives prévues permettront la mise en œuvre des pulvérisations hivernales de protection des plantes dans les vergers.

Source : NIMH