

'Activités difficiles de protection des plantes à la mi-mars'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 19.03.2020 Брой: 3/2020



Début mars, des précipitations comprises entre 20 – 40 l/m² sont tombées sur l'Ouest et le centre de la Bulgarie, ce qui a entraîné une augmentation des réserves d'humidité du sol dans la couche de 50 cm et de 100 cm sous les cultures agricoles.

Mi-mars, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par des températures quotidiennes moyennes autour et au-dessus du minimum biologique des cultures agricoles hivernantes. Leurs processus de végétation se dérouleront à un rythme normal. Les précipitations prévues durant la première moitié de la période, à nouveau plus importantes en quantité dans le sud-ouest et le centre de la Bulgarie, favoriseront l'augmentation des réserves d'humidité dans la couche de sol d'un mètre.

Durant cette période, le blé sera au stade du tallage massif et une augmentation du coefficient de tallage sera observée. Le colza entamera son ramification. Chez les espèces fruitières, le gonflement et le débourrement des bourgeons auront lieu, et chez certains fruits à noyau (pêcher, abricotier) dans le centre et l'est de la Bulgarie, le stade de la floraison débutera également. Pendant cette période, la fenêtre agrotechnique pour les semis de tournesol dans le sud de la Bulgarie commence.

Les précipitations prévues dans de nombreux endroits des zones de plein champ entraveront la réalisation d'un travail du sol de qualité et la mise en œuvre des activités de protection des plantes.

Source NIMH