

Refroidissement et changement brusque des conditions agrométéorologiques fin mars

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.03.2020 *Брой:* 3/2020



Après les températures supérieures à la normale en fin de deuxième et début de troisième décade de mars, une vague de froid et un changement brutal des conditions agrométéorologiques sont attendus pendant la période (20-26 mars). D'ici la fin de la période, les valeurs prévues des températures moyennes journalières seront nettement inférieures à la norme pour la troisième décade et, dans la plupart des zones de plein champ, également inférieures au minimum biologique requis pour la végétation des cultures semées à l'automne. Le refroidissement attendu entraînera un ralentissement, et dans certaines parties de l'ouest de la Bulgarie, où des chutes de neige sont prévues, un arrêt à court terme des processus végétatifs des céréales d'hiver et du colza.

Au début du printemps, le blé sera principalement au stade du tallage, et le colza – au début de la formation des ramifications.

Dans la seconde moitié de la période, des températures minimales négatives sont à nouveau prévues, avec un risque de dommages pour certaines cultures fruitières entrées en floraison – amandier, abricotier, pêcher. Des dégâts dus au gel sur certaines espèces fruitières à floraison précoce (abricotier, amandier) ont été enregistrés fin de la deuxième décade de mars par endroits dans les régions orientales et sud-est du pays.

Des conditions favorables pour la réalisation des travaux agrotechniques saisonniers seront présentes en début de période. La période suivante coïncide avec la fenêtre agrotechnique optimale pour le semis du tournesol dans le sud de la Bulgarie.

Dans la seconde moitié de la période, afin de réduire le risque de dommages aux arbres fruitiers avancés dans leur développement, la génération de fumée peut être appliquée – l'une des mesures les plus utilisées, qui permet d'obtenir un effet thermique de 1 à 3°C. Lorsque cela est possible, une pulvérisation préventive avec des produits homologués contre le gel et le froid est conseillée.

Source : INMH