

Augmentation significative des températures au début du mois d'avril

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.04.2020 Брой: 4/2020



Après les phénomènes météorologiques hivernaux inhabituels fin mars et début avril, qui ont causé des dégâts supplémentaires aux cultures fruitières avancées dans leur développement, les conditions agrométéorologiques vont subir un changement significatif au cours de la période de sept jours à venir.

Une hausse des températures est prévue pour les premiers jours de la période. Dans les zones de plaine, leurs valeurs moyennes journalières atteindront et dépasseront le minimum biologique requis pour la végétation des cultures céréalières d'hiver et du colza.

Une normalisation des conditions thermiques et une activation des processus végétatifs dans les peuplements semés à l'automne et les cultures de printemps semées sont prévues en fin de période. À la fin de la première décade d'avril, les stades suivants seront observés sur le blé et l'orge : tallage, passage à la montaison et stade de montaison, principalement dans les peuplements de certaines parties de la plaine du Danube et dans les régions orientales du pays (stations agrométéorologiques : Novachene, Silistra, Tsarev Brod, Razgrad, D. Chiflik, Karnobat). Sur le colza d'hiver, le début du stade du gonflement des bourgeons sera observé.

D'ici la fin de la première décade d'avril, en de nombreux endroits des régions de plaine, la teneur en eau élevée des couches supérieures du sol, résultant des précipitations importantes du début du printemps, gênera la réalisation des travaux de préparation du sol avant semis et l'ensemencement des cultures de printemps mi-précoces. Pour cette raison, des retards dans les semis de tournesol sont attendus. L'échéance agrotechnique pour le semis du tournesol dans la plaine du Danube est jusqu'au milieu de la première décade d'avril, et jusqu'à la fin de la décade – dans le Nord-Est de la Bulgarie, dans les zones côtières et dans les hautes plaines du Sud-Ouest de la Bulgarie.

Des conditions favorables pour la réalisation des traitements phytosanitaires dans les cultures fruitières non touchées par les gelées printanières se présenteront durant la seconde moitié de la période.

Source NIMH