

Scarabée velu – *Epicometis hirta*

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.04.2020 Брой: 4/2020



Description du ravageur

Le charançon velu est un ravageur largement répandu des cultures fruitières en Bulgarie. Il détruit complètement les fleurs attaquées en rongant tous les organes floraux (pétales, étamines, pistil). De plus, il ronge les boutons floraux non ouverts, les jeunes pousses et les jeunes feuilles. Parmi les cultures fruitières, il attaque et endommage le plus sévèrement le coing, le poirier, le pommier et, moins fréquemment, le prunier, le griottier, le pêcher et le fraisier. Outre celles-ci, il s'attaque aux petits fruits, à la vigne, aux cultures crucifères, aux céréales, aux légumineuses, à certaines plantes des familles des Chénopodiacées et des Apiacées, etc.

Dégâts :

Le ravageur développe une génération par an et hiverne sous forme d'insecte adulte dans le sol. Les charançons deviennent actifs tôt au printemps et causent des dégâts pendant la floraison, attaquant toutes les espèces fruitières en fleurs. Ils sont actifs par temps ensoleillé, tandis que par temps frais et froid, ils se cachent sous les mottes de terre ou restent immobiles sur les plantes.

Lors des printemps secs et chauds, les dégâts causés par le charançon sont importants. Les adultes se nourrissent des fleurs, en rongant les pistils, les étamines et les pétales.

Les fleurs jaunissent et semblent comme endommagées par le gel. Le charançon creuse également des piqûres dans les jeunes fruits, notamment chez la cerise, qui se déforment.

Lutte :

Le charançon velu apparaît pendant la période de floraison des cultures fruitières, et l'utilisation de produits phytosanitaires est très restreinte.

Sur de petites surfaces, la collecte manuelle aux heures matinales et la destruction des charançons sont appliquées, après avoir secoué les branches ou les arbres entiers.

Les mesures de lutte sont mises en œuvre à un seuil de nuisibilité économique de 3 à 5 individus/100 rosettes, ou 5% d'inflorescences endommagées. La lutte chimique contre le charançon velu est difficile, premièrement parce qu'elle est effectuée pendant la floraison et que la plupart des produits phytosanitaires sont nocifs pour les abeilles, et deuxièmement parce que la couverture corporelle du charançon offre une très bonne protection contre les pesticides.

Insecticides homologués pour la lutte : Vaztak Nov 100 EC – 10 ml/da (dans le colza).