

La martre des pins peut causer des dégâts importants aux fruits des cerisiers.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.05.2020 Брой: 5/2020



La cétoine dorée – *Cetonia aurata* L. est répandue dans tout le pays. Elle endommage les arbres fruitiers, avec une préférence pour le cerisier et le poirier. On la trouve également sur la vigne, le rosier et l'égantier. Elle a également été trouvée causant des dégâts sur le maïs et le chou. Elle apparaît le plus fréquemment sur les fleurs de l'égantier et du rosier. Elle se nourrit aussi des parties florales de la camomille, de la coriandre et de l'achillée millefeuille.

Ces dernières années, la cétoine dorée a été observée dans certaines plantations de cerisiers et jardins familiaux de la région de Kyustendil. Sa densité de population est plus élevée dans les zones envahies par les

mauvaises herbes et les buissons d'églantiers et les vergers de cerisiers négligés. Sur des arbres individuels, jusqu'à 80 – 100 coléoptères ont été enregistrés.

L'insecte adulte est un coléoptère relativement grand. La longueur du corps peut atteindre 2 cm. Le pronotum et les élytres sont d'un vert intense avec un éclat métallique doré. La face ventrale est de couleur cuivrée. Il y a des bandes transversales blanches sur les élytres.

La cétoine dorée a une génération par an. Les coléoptères hibernent dans le sol. Au printemps, ils apparaissent pendant la floraison des arbres fruitiers. Les coléoptères sont actifs et volent en milieu de journée, lorsqu'il fait le plus chaud. Ils rongent les étamines et le pistil des fleurs et endommagent les feuilles et les fruits.

Sur les fruits de cerisier infestés, ils creusent des blessures profondes et dans la plupart des cas les détruisent complètement. Nous avons enregistré 80% de fruits endommagés sur un seul arbre.

Dégâts

Les femelles fécondées pondent leurs œufs dans le bois pourri et dans un sol riche en bois décomposé. Les larves se développent dans cet environnement en décomposition et se nymphosent la même année.

La lutte chimique contre la cétoine dorée doit être dirigée contre le stade adulte, qui cause les principaux dégâts. Les insecticides n'ont pas été testés jusqu'à présent contre ce ravageur car il ne se produisait pas fréquemment. La lutte est également compliquée par le fait que les pulvérisations doivent être effectuées au moment de la maturation des fruits et que les délais avant récolte doivent être respectés.

Lutte

La cétoine dorée appartient à la famille des Scarabéidés, qui comprend également le hanneton. Il est recommandé d'utiliser des insecticides avec un délai avant récolte court, qui sont approuvés contre le hanneton : Vaztak Nov 100 EC – 10 ml/da. Des pièges bleu clair ou blancs avec un attractif peuvent également être utilisés. Pour réduire les dégâts causés par la cétoine dorée, de bonnes pratiques agronomiques sont également nécessaires – travail régulier du sol, fertilisation, collecte, élimination et destruction de la végétation adventice, des buissons d'églantier et des résidus végétaux en décomposition, où se développent les larves du ravageur.