

Précipitations et risque accru de grêle début mai

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.05.2020 Брой: 5/2020



Au cours de la période de sept jours à venir, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps instable et des températures quotidiennes moyennes proches des normes climatiques pour la première décade de mai. Des précipitations généralisées sont prévues pendant la période, accompagnées d'une amélioration des conditions pour la végétation des cultures d'automne et des cultures de printemps semées. Après la sécheresse printanière accentuée dans les régions du nord-est, les précipitations attendues offriront une opportunité de récupération pour une partie des céréales d'hiver qui sont dans un état critique. Le déficit en humidité du sol dans de nombreux endroits du nord-est de la Bulgarie a été un facteur limitant pour le développement du blé et une cause de jaunissement d'une partie des peuplements.

Dans les régions du sud-ouest et dans la majeure partie de la plaine de Thrace, où des précipitations d'importance économique sont tombées en avril – dans certains endroits plus de 50-60 l/m² (Kyustendil-67 l/m², Blagoevgrad-52 l/m², Sandanski-73 l/m², Pazardzhik-83 l/m², Plovdiv-87 l/m², Haskovo-93 l/m², Stara Zagora-50 l/m², Chirpan-67 l/m²), l'état des céréales d'hiver est bon.

Au cours de la prochaine période, dans les zones de plein champ, le blé et l'orge passeront de l'élongation de la tige à l'épiaison et au stade de l'épiaison. Pour le maïs et le tournesol, selon les dates de semis, les stades de levée et de formation des feuilles seront observés.

Durant la première semaine de mai, des températures minimales critiques pour les cultures agricoles ne sont pas prévues, mais la probabilité de grêle reste élevée. En cas de dégâts dus à la grêle, il est recommandé de traiter les cultures affectées à la première occasion avec des fongicides contenant du cuivre pour réduire le risque d'infections secondaires.

Source : NIMH