

Prévisions agrométéorologiques pour le mois de mai

Автор(и): Растителна защита
Дата: 17.05.2020 *Брой:* 5/2020



Durant la première décade de mai, le développement des cultures agricoles se poursuivra à un rythme modéré, avec des températures quotidiennes moyennes proches des normes climatiques. Au début du mois de mai, les précipitations attendues seront déterminantes pour la survie d'une partie des cultures céréalières d'hiver dans le nord-est de la Bulgarie. Fin avril, en de nombreux endroits des régions du nord-est, le niveau des réserves en eau du sol pour le blé dans les couches de 50 cm et 100 cm était exceptionnellement bas pour la saison, inférieur à 55-60% de la capacité au champ, en raison de précipitations inférieures à la normale durant la première moitié du printemps. Pour cette raison, une partie des peuplements de blé se trouve dans un état

critique. Des dommages et un jaunissement de la masse foliaire (jusqu'à 50-60%), conséquence du déficit hydrique du sol, ont été enregistrés sur le blé aux stations agrométéorologiques de Silistra et Tsarev Brod.

Durant la première décennie de mai, le stade de l'épiaison sera observé chez le blé et l'orge dans les régions de plaine.

À la fin de la première et durant la deuxième décennie, une augmentation des températures et une accélération de la végétation des cultures céréalières d'hiver et des cultures de printemps semées sont prévues. Durant cette période, la floraison, la fécondation et la formation du grain auront lieu chez le blé.

Durant la troisième décennie, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps instable et frais pour la période. Les précipitations significatives attendues revêtiront une importance exceptionnellement grande pour les cultures céréalières d'hiver, chez lesquelles le remplissage du grain sera en cours. Fin mai, une partie des peuplements d'orge et de blé dans certains endroits des régions du sud entrera dans le stade de la maturité laiteuse.

Durant le mois, la formation des feuilles aura lieu chez le maïs et le tournesol. À la fin de la troisième décennie, chez le tournesol semé dans les délais agrotechniques, la formation de l'inflorescence sera observée.

Chez les cultures fruitières, la formation et l'agrandissement des fruits noués se produiront. Dans la vigne, la séparation des inflorescences sera observée et, à la fin du mois, le stade de la floraison également.

Des précipitations fréquentes en mai créeront des conditions favorables au développement d'un certain nombre de maladies fongiques : les mildious sur la vigne et les cultures maraîchères ; la tavelure sur les espèces fruitières à pépins, la pourriture brune précoce et la criblure sur les arbres fruitiers à noyau ; les rouilles (jaune, brune) et la fusariose de l'épi chez les cultures céréalières d'hiver.

Des conditions plus propices à la réalisation des traitements phytosanitaires se présenteront durant la seconde moitié de la première décennie et la plupart des jours de la deuxième décennie.

En mai, des températures minimales critiques pour les cultures agricoles ne sont pas prévues, mais la probabilité de grêle reste élevée. En cas de dégâts dus à la grêle, il est conseillé que les cultures touchées soient traitées à la première occasion avec des fongicides à base de cuivre pour une cicatrisation plus rapide des blessures et pour réduire le risque d'infections secondaires.

Source : NIMH