


13 mai 2024

Météo instable et fraîche pour la saison

La semaine dernière a été marquée par une météo instable et fraîche pour la saison, avec des températures inférieures aux normales saisonnières.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 31.05.2020 *Брой:* 5/2020



Fin mai et début juin, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps instable et frais pour la saison. Des précipitations significatives sont prévues dans de nombreuses régions du pays, améliorant les réserves d'humidité dans les couches supérieures du sol et les conditions pour la végétation des cultures de printemps. Les précipitations attendues fin mai et début juin s'avéreront trop tardives pour une partie des peuplements de blé dans certaines zones de l'est de la Bulgarie (Provadia, Shabla, D. Chiflik, Karnobat), où les

stades d'épiaison, de floraison, de fécondation et de formation du grain se sont produits sous un déficit hydrique du sol croissant. Dans certaines régions orientales, les peuplements de blé prématurément jaunis, avec des épis mal grainés, ne seront pas récoltés.

Au cours de la période suivante, dans les hauts champs, les cultures céréalières d'hiver seront au stade du remplissage du grain. Dans les régions de plaine, le blé sera au stade de la maturité laiteuse. L'orge sera au stade de la maturité laiteuse et, à la fin de la période, commencera la transition vers la maturité cireuse. Le colza sera au stade de la maturation. Pendant la période, le maïs et le tournesol seront au stade de la formation des feuilles. Dans le tournesol semé dans les délais agrotechniques, on observera la formation de l'inflorescence.

Le temps frais prévu avec des précipitations fréquentes pendant la période créera des conditions pour une augmentation de la pression d'infection de certains agents pathogènes fongiques – le mildiou dans les vignobles et les cultures maraîchères, la pourriture brune tardive chez les cultivars de cerisiers plus tardifs, la tavelure chez les espèces de fruits à pépins, etc. Début juin, la lutte contre l'un des ravageurs les plus dangereux dans les vergers – le carpocapse – ne doit pas être sous-estimée. Les conditions pour réaliser les pulvérisations de protection des plantes seront présentes au milieu de la première décade de juin.

Source : NIMH