

Prévisions agrométéorologiques pour le mois de juin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 10.06.2020 Брой: 6/2020



Pendant la plupart des jours des première et deuxième décades de juin, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps instable. Au début du mois, le développement des cultures agricoles se poursuivra à un rythme plus lent, sous des températures inférieures à la normale. Jusqu'au milieu de la première décade, des précipitations sont prévues dans de nombreuses régions du pays, améliorant les réserves d'humidité du sol dans la couche de 50 cm et les conditions pour la végétation des cultures de printemps. Les pluies de fin mai et les précipitations attendues début juin se sont avérées beaucoup trop tardives pour les cultures semées à l'automne dans de nombreux endroits de l'est de la Bulgarie, où les phases reproductives de leur développement se sont déroulées sous un déficit d'humidité du sol croissant. Dans une grande partie des régions orientales, des rendements fortement réduits sont

prévus, et dans certains endroits, les cultures prématurément jaunies, aux épis mal remplis, ne seront pas récoltées.

Après le temps plus frais que d'habitude pour la saison pendant la seconde moitié de la première décade, une amélioration des conditions thermiques est prévue. Pendant la décade, dans les cultures céréalières d'hiver des champs élevés, le remplissage des grains aura lieu. Dans les zones de plaine, le blé sera au stade de la maturité laiteuse, et vers la fin de la décade, dans certains endroits, le début du stade de la maturité cireuse sera également observé. *Pendant la période interphase du remplissage du grain à la maturité laiteuse, les larves de la punaise des blés causent de sérieux dégâts au blé. Durant cette période, les cultures de blé doivent être surveillées pour détecter la présence du ravageur, et si sa densité dépasse le seuil économique de nuisibilité, un traitement en temps opportun est nécessaire.*

Au début de la deuxième décade, dans les zones de plaine, l'orge sera principalement au stade de la maturité cireuse, et le colza sera au stade de la maturation.

Pendant la seconde moitié de juin, le développement des cultures agricoles se poursuivra à un rythme plus rapide. À la fin de la deuxième et au début de la troisième décade, le blé sera principalement au stade de la maturation.

D'ici la fin juin, certaines cultures de printemps entreront dans les phases reproductives de leur développement : chez le tournesol, le début de la floraison sera observé, et chez les hybrides de maïs plus précoces – la sortie des panicules et la floraison de la panicule.

Le temps instable prévu en juin, avec des précipitations fréquentes, créera des conditions propices au développement d'un certain nombre de maladies fongiques : mildiou dans les vignobles et les cultures maraîchères, tavelure sur les arbres fruitiers, etc. Pendant le mois, la probabilité de chutes de grêle restera élevée. Après une chute de grêle, les cultures fruitières et maraîchères touchées doivent être traitées avec des fongicides à base de cuivre à la première occasion.

Source : INMH