

Période avec des conditions favorables à l'augmentation du fond infectieux des maladies fongiques dans les cultures agricoles

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.07.2020 Брой: 7/2020



Fin juin et début juillet, les conditions agrométéorologiques vont subir un changement significatif. Durant les derniers jours de juin, aucune précipitation n'est prévue dans les zones de culture, ce qui offrira une opportunité pour réaliser certains traitements phytosanitaires urgents. Le temps instable persistant de la période passée a créé des conditions propices à l'augmentation du fond infectieux de plusieurs maladies fongiques : la tavelure, la criblure et la moniliose tardive sur les arbres fruitiers ; le mildiou dans les vignobles et les cultures maraîchères, etc. Dans de nombreuses régions du pays, les précipitations importantes ont entravé la récolte des céréales mûres. Dans certaines parcelles de blé engorgées, un noircissement des épis a commencé, ce qui présente un risque de détérioration de la qualité des grains.

Durant la période suivante, le développement des cultures de printemps se poursuivra à un rythme accéléré, avec des températures autour et au-dessus des normes climatiques pour le début de l'été et avec des réserves en eau bonnes à très bonnes dans les couches supérieures du sol. Dans la plupart des régions du pays, à l'exception de l'extrême nord-ouest (station agrométéorologique de Buzovets) et du sud-ouest (station agrométéorologique de Sandanski), les réserves en eau du sol sur 50 cm de profondeur se situent à des niveaux supérieurs à 75-80% de la capacité au champ. Durant cette période, le tournesol sera aux stades de formation de l'inflorescence et de floraison, principalement dans les parcelles des régions méridionales. Chez les hybrides de maïs précoces, on observera les stades de la sortie des panicules et de la floraison des panicules, tandis que chez les hybrides plus tardifs – la formation des feuilles. Fin juin et début juillet, les champs de maïs devront être inspectés pour détecter la présence de l'un des ravageurs les plus importants – la pyrale du maïs, et lorsque sa densité dépasse le seuil de nuisibilité économique (10 pontes pour 100 plantes), un traitement est nécessaire (contre les jeunes larves avant qu'elles ne pénètrent dans les tiges).

Début juillet, des précipitations sont à nouveau prévues et les conditions pour réaliser l'activité la plus importante – la récolte du blé – se détérioreront.

Source : NIMH