

Prévisions agrométéorologiques pour juillet

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.07.2020 *Брой:* 7/2020



Durant la première moitié de la première décade de juillet, le développement des cultures agricoles se déroulera dans des conditions thermiques supérieures à la normale. Au début du mois, dans la majeure partie du pays, à l'exception des régions extrêmes du nord-ouest (station agrométéorologique de Buzovets) et du sud-ouest (station agrométéorologique de Sandanski), la végétation des cultures de printemps aura lieu dans des conditions de bonnes réserves d'humidité du sol dans les couches de 50 cm et 100 cm (plus de 75-80% de la capacité au champ) – résultat des précipitations importantes et supérieures à la normale de juin, qui ont localement dépassé 90-100 l/m² (Montana – 96 l/m², Veliko Tarnovo – 133 l/m², Ruse – 90 l/m², Silistra – 136 l/m², Dobrich – 105 l/m², Varna – 103 l/m², Kazanlak – 104 l/m², Haskovo – 92 l/m², Kardzhali – 173 l/m², Stara Zagora – 115 l/m²).

Durant la première décade, selon la précocité des hybrides de maïs, diverses phases se produiront : formation des feuilles, épiaison, floraison de la panicule et apparition des soies. Chez le tournesol, dans les zones de plaine, la phase de floraison prédominera, tandis que dans les peuplements des champs plus élevés – ce sera la formation de l'inflorescence. Chez les légumineuses à grains (haricots, soja), on observera la formation des gousses.

Durant la deuxième et le début de la troisième décade, le développement des cultures agricoles se poursuivra à un rythme modéré, avec des températures proches et légèrement inférieures à la normale pour la période. Les précipitations fréquentes prévues durant cette période auront un effet bénéfique sur les cultures de printemps qui sont au stade reproductif de leur développement, période où les besoins en eau augmentent fortement (chez le maïs, durant la période allant de l'épiaison à la maturité laiteuse, la consommation quotidienne d'eau atteint 6-7 m³/décare). Au début de la troisième décade de juillet, une partie des hybrides précoces de maïs dans les zones de plaine entrera au stade de la maturité laiteuse. Chez le tournesol, la formation et le remplissage des graines auront lieu. À la fin du mois, dans les peuplements semés dans les délais agrotechniques, localement dans la plaine du Danube et dans les régions du sud, on observera le début de la phase de maturation.

Durant la dernière semaine de juillet, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps relativement sec, chaud et caniculaire, ce qui nécessitera la mise en œuvre d'un régime d'irrigation approprié pour les hybrides tardifs de maïs et les cultures maraîchères de pleine terre tardives. Les conditions météorologiques durant cette période limiteront le développement d'un certain nombre de maladies fongiques, à l'exception des oïdiums sur les cultures maraîchères et les arbres fruitiers, et de l'oïdium sur la vigne.

En juillet, les pulvérisations de protection des plantes dans les cultures fruitières contre la deuxième génération de carpocapses, les pucerons et les acariens ne doivent pas être sous-estimées. Des conditions plus favorables pour réaliser les traitements phytosanitaires se présenteront la plupart des jours des première et troisième décades, durant les heures les plus fraîches de la journée.

Durant les périodes les plus chaudes de juillet, avec des températures maximales allant jusqu'à 38-39°C, le risque d'incendie durant la récolte des céréales augmentera.