

Protection des plantes dans les pêchers et abricotiers fin juin et début juillet

Автор(и): проф. Мария Боровинова

Дата: 07.07.2020 Брой: 7/2020



Chez le **pêcher**, les pulvérisations se poursuivent contre l'oïdium, le criblure, la moniliose, l'Anarsia, la tordeuse orientale du pêcher et les pucerons.

Pour l'oïdium, l'un des fongicides suivants est utilisé : Difkor 250 EC – 20 ml/da, Embrelia – 150 ml/da, Indar 5 EW – 150 ml/da, Karamat 2.5 EW – 300 ml/da, Kozavet DF – 150 g/da, Kumulus DF – 750 g/da, Luna Experience – 50 ml/da, Miklofil – 32-60 ml/da, Password 25 WG – 50 g/da, Ritual – 32-60 ml/da, Sercadis – 15 ml/da, Signum WG – 45 g/da, Systhane 20 EW – 15-36 ml/da, Systhane EcoZome EW – 65-200 ml/da, Score 250 EC – 20-30 ml/da, Solfo 80 WG – 750 g/da, Sulgran – 500 g/da, Sulphur WG – 600 g/da, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da, Topaz 100 EC – 50 ml/da, Flosul SC – 500 ml/da, Fontelis SC – 120 ml/da, Heliosulfur C – 125-500

ml/da, Hercules 120 SC – 15-25 ml/da. Parmi les fongicides listés, Indar 5 EW – 150 ml/da, Karamat 2.5 EW – 300 ml/da, Luna Experience – 50 ml/da, Password 25 WG – 50 g/da, Signum – 45 g/da, Systhane 20 EW – 15-36 ml/da, Systhane EcoZome EW – 65-200 ml/da, Score 250 EC – 20-30 ml/da, Fontelis SC – 120 ml/da sont également efficaces contre la moniliose et sont utilisés pour la lutte simultanée contre les deux maladies.

Pour la tordeuse orientale du pêcher et l'Anarsia, l'un des insecticides suivants est utilisé : Avant 150 EC – 33.3 ml/da, Affirm Opti – 200-225 g/da, Voliam Targo 063 SC – 75 ml/da, Delegate 250 WG – 30 g/da, Imidan 50 WG – 150 g/da, Coragen 20 SC – 16-30 ml/da, Lamadex Extra – 70 g/da, Meteor – 90 ml/da, Sumi Alpha 5 EC – 0.02%.

En cas de forte densité de pucerons, la pulvérisation est effectuée avec : Abanto – 60 ml/da, Ascot WG – 40-80 g/da, Deka EC/Desha EC/Dena EC/Poleci/Decision – 30-50 ml/da, Decis 100 EC – 8.75-12.25 ml/da, Estrela WG/Lamsha WG/Adalam WG/Indulam WG – 40-80 g/da, Calypso 480 SC – 20 ml/da, Lamadex Extra – 40-60 g/da, Movento 100 SC – 0.075-0.1%, Mospilan 20 SG – 25 g/da, Natur Breaker – 75 ml/da, Proteus O-TEC – 0.05% - 0.06%, Teppeki – 14 g/da.

Chez l'**abricotier**, les pulvérisations sont effectuées pour cibler la moniliose, la gnomoniose, le criblure, l'Anarsia et la tordeuse orientale du pêcher. *Pour la moniliose, l'un des fongicides suivants est utilisé : Delan 700 WG – 0.05%, Difkor 250 EC – 20 ml/da, Embrelia – 150 ml/da, Indar 5 EW – 150 ml/da, Karamat 2.5 EW – 300 ml/da, Luna Experience – 50 ml/da, Password 25 WG – 50 g/da, Signum WG – 30 g/da, Systhane 20 EW – 12.5-30 ml/da, Chorus 50 WG – 40-50 g/da. Parmi les fongicides indiqués, Delan 700 WG – 0.05%, Karamat 2.5 EW – 300 ml/da et Signum WG – 30 g/da sont également efficaces contre la gnomoniose. Pour l'Anarsia et la tordeuse orientale du pêcher, l'un des insecticides indiqués pour le pêcher est utilisé.*

Pour que les traitements contre les maladies et les ravageurs dans les cultures fruitières soient efficaces, ils doivent être réalisés de manière opportune et de haute qualité. De plus, il est très important de déterminer la nécessité de réaliser un traitement donné, ce qui est lié à une surveillance spécifique pour déterminer la densité des ravageurs, et lorsque les seuils économiques de nuisibilité sont dépassés, un traitement doit être effectué.