

Prévision agrométéorologique pour la fin du mois de juillet

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.07.2020 Брой: 7/2020



Fin juillet, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps chaud avec des températures autour et au-dessus de la norme. Durant la première moitié de la période, des précipitations sont à nouveau prévues dans l'Ouest et dans certaines parties du centre de la Bulgarie, ce qui améliorera l'humidité des couches supérieures du sol. Au cours de la période passée dans ces régions, des pluies significatives pour l'agriculture, comprises entre 20 – 40 l/m², ont été enregistrées, mais avec un caractère local. Dans le reste du pays, l'absence de précipitations a entraîné un déficit hydrique du sol croissant.

Durant la période, les phénophases de floraison et de remplissage des graines se dérouleront chez le tournesol. Chez certains hybrides plus précoces, semés dans les délais agrotechniques, la phase de maturation

interviendra (stations agrométéorologiques de Sliven, Lyubimets). Chez le maïs, différentes phases seront observées – chez les hybrides tardifs, l'épiaison et la floraison seront en cours ; chez les hybrides mi-précoces, on observera l'émission et le brunissement des soies ; et chez les hybrides de maïs les plus précoces dans certaines parties de la plaine du Danube (station agrométéorologique de Pavlikeni), on observera la maturité laiteuse. Dans la vigne, on observera la phase de coloration et de ramollissement des baies.

Durant la période, les conditions seront propices à la réalisation des activités agrotechniques saisonnières liées au travail du sol sur les surfaces libérées des cultures céréalières d'hiver – le déchaumage, dans le but d'interrompre les capillarités du sol et de préserver l'humidité disponible du sol, le labour et le travail du sol avant semis, et les traitements avec des herbicides totaux en cas de forte infestation adventice des parcelles après récolte. Dans les vergers de pommiers et les vignobles, les pulvérisations fongicides se poursuivent pour prévenir l'infection et le développement de l'oïdium. Les activités de protection des plantes doivent être réalisées à une température de l'air ne dépassant pas 25°C.

Source NIMH