

Prévisions agrométéorologiques pour le mois d'août

Автор(и): Растителна защита
Дата: 09.08.2020 Брой: 8/2020



La période agrotechnique pour le semis du colza commence au cours de la troisième décade d'août. En août, pour les variétés tardives d'arbres fruitiers, il ne faut pas sous-estimer l'activité nuisible de la dernière génération de vers des fruits. Le temps relativement sec pendant la plupart des jours du mois sera un prérequis pour une augmentation des populations d'acariens. Dans les vignobles, il est nécessaire de surveiller l'apparition et la densité des chenilles de la troisième génération de l'eudémis de la vigne.

En août, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par des températures et des précipitations proches des normes climatiques pour le mois.

Au début du mois d'août, le développement des cultures de printemps tardives dans la plupart des régions du pays se poursuivra dans un contexte de déficit hydrique du sol qui s'accroît. Des exceptions seront observées par endroits dans le nord-ouest de la Bulgarie et dans la plaine de Sofia, où les précipitations de juillet ont dépassé les normes mensuelles (Novo Selo - 84 l/m², Vratsa - 128 l/m², Montana - 88 l/m², Sofia - 111 l/m², Kyustendil - 72 l/m², Dragoman - 56 l/m²) et ont augmenté le niveau des réserves en eau dans la couche de sol de 50 et 100 cm. Dans les régions occidentales du pays, les précipitations prévues durant la seconde moitié de la première décennie d'août fourniront l'humidité nécessaire à la végétation des hybrides de maïs plus tardifs et des cultures secondaires.

Dans l'est de la Bulgarie et dans les régions méridionales, aucune précipitation n'est attendue pendant la première décennie d'août et par endroits, l'aggravation de la sécheresse remettra en question la récolte des cultures de printemps cultivées en conditions non irriguées. Dans certaines de ces régions, en raison des faibles précipitations de juillet - par endroits inférieures à 2-3 l/m² (Ruse, Shabla, Stara Zagora, Sliven, Karnobat, Burgas, Haskovo, Kardzhali), les réserves en eau du sol dans la couche de 50 et 100 cm sont complètement épuisées (station agrométéorologique de Sliven).

Vers la mi-août, les températures élevées prévues, avec des valeurs maximales allant jusqu'à 36-38°C, entraîneront un raccourcissement des périodes interphasiques dans le développement des cultures de plein champ tardives. Des valeurs de cet ordre, combinées à une faible humidité atmosphérique, auront un impact négatif sur la floraison et la fécondation des cultures maraîchères de production tardive en plein champ.

Au cours de la première décennie d'août, les hybrides de maïs précoces termineront leur développement, et les hybrides mi-précoces entreront en stade de maturité laiteuse. Chez le tournesol dans la plaine du Danube et dans les régions méridionales, le stade de maturation sera observé. À la fin de la deuxième et au début de la troisième décennie dans les régions de plaine, le tournesol sera principalement en maturité technique. Durant la troisième décennie, les hybrides de maïs mi-tardifs entreront en maturité cireuse. Chez le riz, le stade de maturité laiteuse sera observé, chez le soja - le stade de maturation, et chez le coton - le début de l'ouverture des capsules.

La probabilité de précipitations, d'amélioration de l'état hydrique du sol dans les couches supérieures et des conditions pour réaliser le travail du sol pré-semis des parcelles destinées à l'ensemencement du colza d'hiver,

est prévue pour la seconde moitié de la troisième décade. La période agrotechnique pour le semis du colza commence au cours de la troisième décade d'août.

En août, pour les variétés tardives d'arbres fruitiers, il ne faut pas sous-estimer l'activité nuisible de la dernière génération de vers des fruits. Le temps relativement sec pendant la plupart des jours du mois sera un prérequis pour une augmentation des populations d'acariens. Dans les vignobles, il est nécessaire de surveiller l'apparition et la densité des chenilles de la troisième génération de l'eudémis de la vigne. Les traitements phytosanitaires doivent être effectués pendant les heures les plus fraîches de la journée avec des produits ayant un délai avant récolte approprié, en accord avec la période de maturation des cultures.

Source : NIMH