

Prévision agrométéorologique pour septembre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 21.09.2020 Брой: 9/2020



En septembre également, les conditions agrométéorologiques en Bulgarie occidentale différeront significativement de celles des régions orientales du pays.

En Bulgarie orientale, elles seront déterminées par des températures supérieures à la normale et des précipitations inférieures à la normale. Dans de nombreux endroits des régions orientales, en raison de la sécheresse estivale prolongée, les cultures de printemps ont achevé leur végétation prématurément. Dans ces zones, la récolte du tournesol et des hybrides de maïs précoces a commencé plus tôt que les dates habituelles, avec des rendements bien inférieurs à la moyenne du pays.

En septembre, dans la plupart des régions occidentales, les stades finaux de développement des cultures agricoles tardives se dérouleront sous des températures supérieures à la normale, avec des précipitations proches des normes climatiques et avec de bonnes réserves d'humidité du sol en fin d'été dans les couches de 50 et 100 cm (plus de 70% de la capacité au champ – Nikolaevo, Kyustendil, Sandanski) – résultat des précipitations supérieures à la normale en août (Vidin – 67 l/m², Lom – 80 l/m², Sofia – 84 l/m², Kyustendil – 98 l/m², Blagoevgrad – 152 l/m², Sandanski – 107 l/m²).

Au cours de la première décade de septembre, des précipitations d'importance agronomique sont à nouveau prévues pour la moitié ouest du pays. Elles auront un effet bénéfique sur les deuxièmes cultures et les hybrides de maïs tardifs, qui seront au stade de la maturité laiteuse. Durant cette décade, dans les zones de plein champ, les hybrides mi-tardifs entreront au stade de la maturité cireuse. Vers la mi-mois, une partie des hybrides tardifs achèveront leur développement. Durant la deuxième décade, le riz sera aux stades de maturité cireuse et pleine maturité. Durant la troisième décade, le stade de maturation interviendra pour le coton, l'arachide, les variétés d'arbres fruitiers d'automne et les cépages plus tardifs. Pour le mois, les valeurs minimales de température prévues sont supérieures aux seuils critiques pour les cultures maraîchères, ce qui est un prérequis pour obtenir une production maraîchère supplémentaire à partir des cultures de plein champ tardives.

La plupart des jours des deuxième et troisième décades, un temps relativement sec est attendu et les conditions seront favorables au nettoyage des parcelles après les cultures de printemps.

En septembre également, dans une grande partie des régions orientales, le manque d'humidité dans les couches supérieures du sol entravera la réalisation qualitative du labour profond et des travaux de pré-semis des parcelles destinées aux semis de colza d'hiver et de céréales d'hiver. La période optimale pour le semis du colza oléagineux s'étend jusqu'à la fin de la deuxième décade du mois. Dans la troisième décade, les dates agrotechniques de semis de l'orge et du blé commencent dans les champs situés à plus haute altitude.

Source : NIMH