

Un automne chaud et sec nous attend en octobre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 06.10.2020 Брой: 10/2020



Au début de l'automne, après la sécheresse prolongée, les conditions agrométéorologiques ont connu un changement positif. Les précipitations, dans de nombreuses régions du pays dépassant 20-30 l/m² (Vratsa, Knezha, Oriahovo, Sofia, Dragoman, Kyustendil, Blagoevgrad, Sandanski, Kazanlak, Kardjali, Elhovo, Razgrad, Bourgas), ont augmenté la teneur en humidité des couches supérieures du sol, ce qui est d'une grande importance pour la bonne mise en œuvre des travaux saisonniers du sol. Des exceptions existent dans certaines parties de la plaine de Thrace et dans les régions orientales, où les précipitations de fin septembre n'ont eu aucune signification économique.

En octobre, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par des températures supérieures aux normes climatiques et des précipitations inférieures à la norme mensuelle.

Durant la première décade, des précipitations significatives ne sont pas prévues et dans la plupart des zones de plein champ, les conditions permettront la réalisation des travaux du sol de pré-semis et l'ensemencement des cultures d'automne. Cette année, la sécheresse a entravé le semis du colza d'hiver et une grande partie des surfaces prévues sera semée en octobre – après les délais agrotechniques. La probabilité est accrue que les peuplements semés plus tard ne puissent pas former une rosette (7-8 feuilles) avant la fin de leur végétation automnale, une phase dans laquelle le colza hiverne avec succès.

Octobre est la période optimale pour le semis des cultures céréalières d'hiver. Dans la première quinzaine du mois se situe l'époque agrotechnique pour le semis du blé dans le nord de la Bulgarie, dans la seconde – pour le sud de la Bulgarie, et dans la troisième décade – pour les zones le long de la côte de la mer Noire.

Durant la première décade, les températures saisonnièrement élevées prévues, avec des valeurs maximales allant jusqu'à 25-30°C, accéléreront la maturation des cépages de vin tardifs et fourniront des conditions pour obtenir une production supplémentaire à partir des cultures maraîchères de la production de plein champ tardive.

Après le temps anormalement chaud de la seconde moitié d'octobre, une normalisation progressive des conditions thermiques est attendue. Les précipitations prévues durant la seconde et la première moitié de la troisième décade seront d'une grande importance pour le déroulement normal des phases initiales de végétation des cultures d'automne semées. À la fin du mois d'octobre, selon les dates de semis, les phases suivantes seront observées dans le blé : levée, troisième feuille et début de tallage dans les peuplements les plus précoces, semés début octobre.

Les températures supérieures à la normale prévues durant le mois créeront des conditions propices à une augmentation de la population de certains ravageurs – le campagnol commun. En octobre, les cultures d'automne doivent être surveillées et, lorsque la population de campagnols dépasse le seuil de nuisibilité économique (2 colonies actives par décare), une lutte avec des rodenticides autorisés (granulés de Phostoxin) est nécessaire – des appâts empoisonnés qui sont placés aux entrées des colonies.

La plupart des jours du mois, les conditions seront favorables à la récolte des fruits. Dans les vergers de pommiers et de poiriers touchés par la tavelure, pour réduire l'inoculum, il est conseillé, au début de la chute des feuilles, après la récolte des fruits, d'effectuer un traitement avec une solution d'urée à 5%.

Pour les espèces à noyau, après la chute massive des feuilles, une pulvérisation avec une bouillie bordelaise à 2% est recommandée contre les agents responsables de la criblure, de la pourriture brune précoce, de la cloque du pêcher, etc.