

Amélioration des conditions pour la réalisation des activités agrotechniques saisonnières à la mi-octobre

Автор(и): Растителна защита

Дата: 21.10.2020 Брой: 10/2020



À la mi-octobre, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps instable et des températures proches de la norme pour la deuxième décennie d'octobre. Les précipitations significatives de la période passée ont dépassé 40-50 l/m² dans de nombreuses régions du pays (N. selo - 66 l/m², Lovech - 61 l/m², Plevén - 73 l/m², V. Tarnovo - 61 l/m², Svishtov - 51 l/m², Kazanlak - 73 l/m², Kardzhali - 60 l/m², Stara Zagora - 54 l/m², Chirpan - 60 l/m², Karnobat - 63 l/m²), ce qui a conduit à une nette amélioration des réserves en humidité du sol dans les couches supérieures et des conditions pour les stades initiaux de végétation des cultures d'automne semées. Au début de la période, des précipitations supplémentaires sont attendues ainsi

qu'une augmentation des réserves en humidité du sol dans la couche de 50 cm. Dans de nombreux endroits de l'Ouest et du Centre de la Bulgarie, elles atteindront des niveaux allant jusqu'à et au-dessus de 75% de la capacité au champ. Un changement positif des niveaux d'humidité du sol est également attendu dans les régions nord-est du pays, qui ont été les plus touchées par la sécheresse prolongée.

Au milieu de la période, une baisse substantielle des températures est prévue, et dans les champs en cuvette – des valeurs minimales critiques pour les cultures maraîchères sensibles au gel. Le développement des cultures d'automne semées à la fin de la deuxième et au début de la troisième décade se déroulera dans des conditions thermiques inférieures à la normale. Pour le blé et l'orge semés durant la première décade d'octobre, le stade de levée prévaudra. Dans les cultures céréalières d'hiver semées plus tôt, à la fin septembre et début octobre, on observera la formation des feuilles (1–2 feuilles).

Une amélioration des conditions pour la réalisation des activités agrotechniques saisonnières, dont la plus importante est le semis du blé, est attendue à la fin de la période. La prochaine période de sept jours coïncide avec le délai agrotechnique pour le semis des cultures céréalières d'hiver dans le sud de la Bulgarie.

Au cours de la troisième décade d'octobre, dans les cultures de blé semées plus tôt, la densité de population de certains ravageurs doit être surveillée : campagnol des champs, chrysomèle du blé, mouches des céréales, etc., qui causent des dégâts sérieux aux cultures céréalières d'hiver dans les stades initiaux de leur végétation.

Source : NIMH