

Conditions favorables pour réaliser les travaux saisonniers de préparation du sol et pour les semis de blé et d'orge à la fin du mois d'octobre.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 28.10.2020 Брой: 10/2020



Les 10 à 20 l/m² de précipitations tombés au cours de la période précédente dans les régions de Vratsa, Knezha, Pleven, Lovech, Sofia et Razgrad ont maintenu une bonne humidité dans les couches supérieures du sol et amélioré les conditions de développement des cultures d'automne semées. Dans la seconde moitié de la période, sur certains sites (Kyustendil, Sofia, Dragoman, Kazanlak), les premières gelées d'automne et des températures minimales critiques pour les cultures maraîchères de production tardive en plein champ ont été enregistrées.

Au cours de la prochaine période de sept jours, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par des températures autour et au-dessus de la norme. Des valeurs minimales critiques et un risque de gel ne sont pas prévus. Durant cette période, pour le blé et l'orge, selon les dates de semis, différentes phases seront observées – de la levée au début de la formation des feuilles. Dans la troisième décennie d'octobre, l'échéance agrotechnique pour le semis des cultures céréalières d'hiver dans les régions le long de la côte de la mer Noire est en cours.

Les quantités de précipitations enregistrées à la fin de la première et durant la deuxième décennie d'octobre ont amélioré l'humidité du sol dans ses couches supérieures. Dans la couche de sol de cinquante centimètres, la teneur en humidité du sol est de 75 à 80 % de la capacité au champ. Cela a amélioré les conditions pour le travail du sol, le semis et le développement initial des cultures céréalières d'hiver et du colza d'hiver.

Pendant la plupart des jours de la période, des précipitations significatives ne sont pas prévues et les conditions seront propices à la réalisation des travaux saisonniers du sol, au semis du blé et de l'orge, à la récolte des fruits des espèces fruitières tardives, et à la conduite d'activités phytosanitaires dans les cultures permanentes. Les conditions permettront l'inspection des peuplements de céréales d'hiver pour la présence et l'activité nuisible du campagnol commun et du chrysomèle du blé.

Source : NIMH