

Soins de protection des plantes pour les vignes et les espèces fruitières en automne

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.11.2020 Брой: 11/2020



Espèces fruitières

Pommes et poires

La plupart des jours d'octobre, les conditions seront propices à la récolte des fruits. Dans les vergers de pommiers et de poiriers touchés par la tavelure, afin de réduire l'infection, il est conseillé, au début de la chute des feuilles et après la récolte des fruits, d'effectuer un traitement avec une solution d'urée à 5%. Après une inspection minutieuse et la détection d'infections tardives, ainsi que contre les maladies qui se développent pendant le stockage des produits, un traitement est effectué avec du Topsin M 70 WDG - 0,1% ou du Top Plus

70 WP - 0,1%. Pour un bon stockage des pommes et des poires et pour réduire les pourritures et les altérations pendant le stockage, il est également recommandé d'effectuer un traitement post-récolte avec du Topsin M 70 WG - 0,120%. Après la pulvérisation, les fruits sont laissés à sécher puis disposés dans des chambres froides ou des locaux de cave profonds et frais.

Espèces à noyau

Pour les espèces à noyau, après la chute massive des feuilles, une pulvérisation avec une bouillie bordelaise à 2% est recommandée contre les agents responsables de la criblure, de la moniliose précoce, de la cloque du pêcher, etc.

Dans ces conditions climatiques, l'environnement est également favorable à l'apparition et à la multiplication d'insectes et d'acariens multivoltins. Ils développent leurs dernières générations, dont la densité de population déterminera en grande partie les dégâts au cours de l'année suivante. Au cours du mois, des conditions sont créées pour la formation d'une forte rosée, qui est une cause d'infections de mildiou sur les tomates tardives et autres.

Vignobles

Durant cette période, la pourriture grise (*Botrytis*) cause des dégâts importants à la vigne, de la véraison à la consommation. Par conséquent, par temps humide et frais, un traitement est effectué avec du Topsin M 70 WDG - 0,2%, Switch 62.5 WG – 100 g/ha, Shavit F 72 WDG – 0,2% (200 g/ha), Quadris 25 SC – 0,075%.

À cette époque, les adultes de la troisième génération de l'eudémis de la vigne volent également. Les larves causent des dégâts aux baies de raisin en maturation ou déjà mûres. Pour lutter contre ce ravageur, un pyréthrinoïde homologué est ajouté à la solution de pulvérisation fongicide.

Les vignes d'un an sont recouvertes de terre sur 3 à 5 cm au-dessus du point de greffe et ainsi préparées pour la saison hivernale.

Conformément à la Loi sur la Protection des Végétaux, les agriculteurs sont tenus d'utiliser uniquement des produits phytopharmaceutiques autorisés pour la culture et le ravageur concernés, et aux doses correspondantes.

