

Précipitations et conditions favorables à la plantation d'arbres fruitiers en novembre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 11.11.2020 Брой: 11/2020



Après la sécheresse prolongée, les précipitations supérieures à la normale en octobre, qui ont dépassé 70-80 l/m² en certains endroits du nord de la Bulgarie (N. selo - 72 l/m², Montana - 71 l/m², Knezha - 80 l/m², Pleven - 94 l/m², Lovech - 79 l/m², Dobrich - 75 l/m²), ont entraîné une augmentation significative des réserves d'humidité dans les couches supérieures du sol et une amélioration des conditions pour le déroulement des phases initiales de végétation des cultures d'automne semées. Fin octobre, dans les stations agrométéorologiques de Silistra, Knezha, Sofia, Kyustendil, Novachene, Nikolaevo, Pavlikeni, Borima, Kazanlak, Pazardzhik, Plovdiv, dans la couche de 50 cm pour les cultures céréalières d'hiver, les niveaux ont atteint et dépassé 75-80% de la capacité au champ.

En novembre, les précipitations prévues, autour et au-dessus de la norme mensuelle, augmenteront les réserves d'humidité automnales dans la couche de sol de 50 et 100 cm.

Pendant la première quinzaine de novembre, le développement des cultures céréalières d'hiver et du colza d'hiver se poursuivra à un rythme modéré, avec des températures proches des normes climatiques. Durant cette période, pour le blé, selon les dates de semis, différentes phases seront observées – levée, troisième feuille et tallage dans les cultures semées tôt, fin septembre et début octobre.

Vers la fin de la deuxième décennie, un refroidissement et un changement substantiel des conditions agrométéorologiques sont prévus. Dans les champs plus élevés, où des précipitations sous forme de neige ne sont pas exclues, on observera un arrêt des processus végétatifs dans les cultures d'automne.

Pendant la troisième décennie de novembre, le développement des cultures dans la plupart des régions agricoles se poursuivra à un rythme ralenti, avec des températures proches du minimum biologique requis pour la végétation des cultures céréalières d'hiver. Des conditions pour des processus végétatifs plus actifs dans le blé, l'orge et le colza d'hiver seront créées dans les régions méridionales et sud-est du pays. Fin novembre, les cultures de blé et d'orge en phase de troisième feuille prédomineront.

Cette année, la sécheresse a entravé les semis en temps voulu du colza d'hiver. Pour cette raison, d'ici fin novembre, seule une partie des cultures, principalement celles semées au début de l'automne, montrera le début de la phase de formation de la rosette (5-6 feuilles).

En novembre, les températures minimales prévues, jusqu'à moins 7°C, sont supérieures aux niveaux critiques pour les cultures d'automne qui sont à un stade initial de leur développement.

Des conditions plus favorables pour la plantation des arbres fruitiers se présenteront pendant la première moitié du mois.

Source : NIMH