

Prévisions agrométéorologiques pour la fin novembre et le début décembre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.11.2020 Брой: 11/2020



Fin novembre, le pays s'est réveillé sous un manteau neigeux. La première neige de la saison est tombée cette nuit dans l'ouest de la Bulgarie. Les températures sont descendues en dessous de zéro, ce qui a transformé les précipitations à Sofia, Razgrad, Pernik et Kyustendil en neige. Le manteau neigeux devrait atteindre jusqu'à 5 cm, sauf dans la plaine danubienne, où son épaisseur sera comprise entre 10 et 15 cm, et jusqu'à 20 cm par endroits.

Fin novembre et début décembre, les conditions agrométéorologiques seront de plus en plus dynamiques. Au début de la période, elles seront caractérisées par un temps doux pour la saison, avec des températures

moyennes journalières dans la plupart des zones de plaine autour ou au-dessus du minimum biologique requis pour la végétation des cultures céréalières d'hiver et du colza d'hiver.

Durant cette période, une baisse significative des températures et un changement des conditions agrométéorologiques sont prévus. Le refroidissement attendu entraînera un ralentissement, et dans les hauts champs et le Pré-Balkan, où des précipitations, y compris de la neige, sont prévues, un arrêt des processus végétatifs dans les cultures semées à l'automne. Des exceptions se produiront dans certaines localités des régions du sud-est et le long de la côte de la mer Noire, où une végétation faiblement exprimée des cultures céréalières d'hiver sera observée.

Début décembre, dans les peuplements de blé semés dans la période agrotechnique, en octobre, le stade du tallage sera observé, stade auquel les cultures céréalières d'hiver hivernent avec succès. Le stade de la troisième feuille prévaudra dans les peuplements semés début novembre. Les peuplements semés tardivement, à la mi-novembre, ne sont pas bien installés et sont aux stades de la levée et de la formation initiale des feuilles. Pour le colza, le stade de la rosette, stade approprié pour l'hivernage, sera observé dans les peuplements semés au début de l'automne.

Au cours de la prochaine période, des précipitations et une amélioration des réserves en eau du sol dans les couches supérieures sont attendues. En raison des précipitations de novembre inférieures à la normale, les réserves en eau du sol dans les couches de 50 et 100 cm dans les champs de blé dans la majeure partie du pays sont anormalement basses pour la saison – par endroits dans les régions de l'est et de l'extrême sud, en dessous de 60% de la capacité au champ (stations agrométéorologiques de Sandanski, Haskovo, Sliven, Razgrad).

Au début de la prochaine période, les conditions seront favorables à la plantation d'arbres fruitiers et à la réalisation des pulvérisations de protection des plantes d'automne dans les cultures fruitières.

Pour protéger les cultures fruitières du froid hivernal, détruire les lichens et les mousses, et repousser la punaise marbrée et le zeuzère, il est nécessaire de traiter les troncs et les branches épaisses des arbres avec un badigeon de chaux à 20% auquel on ajoute une petite quantité d'argile.