

Prévisions agrométéorologiques pour décembre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 06.12.2020 Брой: 12/2020



Début décembre, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par des températures inférieures à la normale. Le refroidissement attendu entraînera un ralentissement, et dans le nord de la Bulgarie ainsi que dans les hauts plateaux, un arrêt des processus végétatifs des céréales d'hiver et du colza.

Durant la première décade, les conditions permettront la réalisation des travaux saisonniers du sol (labour profond des parcelles destinées aux semis de printemps) et des activités phytosanitaires dans les cultures permanentes. Au milieu de la période, des précipitations généralisées et une amélioration de l'humidité du sol sont prévues.

Dans la seconde moitié de la première décade, une hausse significative des températures est prévue, mais leurs valeurs moyennes journalières, à l'exception de certains endroits dans les régions du sud-est et le long de la côte de la mer Noire, n'atteindront pas le minimum biologique requis pour la végétation des cultures semées en automne.

Durant la plupart des jours des deuxième et troisième décades, les températures prévues, autour et au-dessus des normes climatiques, maintiendront les céréales d'hiver en dormance dans la plus grande partie du pays. Des exceptions sont possibles pour le blé et l'orge dans les régions extrêmes du sud et du sud-est. Dans ces régions, durant les périodes relativement plus chaudes, une reprise à court terme des processus végétatifs des cultures semées en automne sera observée, mais aucun changement dans les phases phénologiques des cultures n'est attendu.

Au début de l'hiver, dans le blé, en raison des semis d'automne retardés et de l'aggravation du déficit hydrique du sol en novembre, différentes phases seront observées. Dans les céréales d'hiver semées en octobre dans les délais agrotechniques, la phase de tallage prédominera. Les cultures semées début novembre hiverneront en phase de troisième feuille, tandis que celles semées tardivement, dans la seconde moitié de novembre, seront en phase de levée et de formation initiale des feuilles. Dans le colza, seule une partie des cultures a réussi, durant leur végétation automnale, à former une rosette, phase dans laquelle les plantes hivernent avec succès.

En décembre, les valeurs prévues des températures minimales, pouvant descendre jusqu'à -11 °C, dans des conditions sans couverture neigeuse et avec une persistance plus prolongée, seront critiques pour les céréales d'hiver qui sont en phase de levée.

Les précipitations attendues en décembre, autour de la norme mensuelle, augmenteront les réserves d'humidité du sol dans la couche de 50 et 100 cm. En raison des précipitations de novembre inférieures à la normale, dans de nombreuses parties du pays de l'ordre de 6–7 l/m², le niveau des réserves d'humidité du sol sous les céréales d'hiver est exceptionnellement bas pour la seconde moitié de l'automne. À certains endroits du sud de la Bulgarie et dans une partie des régions orientales, elles sont inférieures à 60 % de la capacité au champ (stations agrométéorologiques de Sandanski, Haskovo, Sliven, Razgrad).

