

Périodes critiques pour les maladies et les ravageurs

Автор(и): Растителна защита
Дата: 19.02.2021 Брой: 2/2021



Tournesol

Levée – 4ème–5ème feuille – charançons (charançon gris du maïs *Tanymecus dilaticolis*, charançon noir de la betterave *Psallidium maxilosum*)

Levée – formation du bouton – mildiou *Plasmopara halstedii*

Germination – levée – floraison – pourriture grise *Botrytis cinerea*

Cotylédons – début de floraison – rouille *Puccinia helianthi*

5ème–6ème feuille – formation du bouton – taches foliaires grises *Diaporthe helianthi*, taches foliaires brunes *Alternaria sp.*, pourriture charbonneuse *Macrophomina phaseolina*, flétrissement verticillien *Verticillium sp.*

Floraison – maturité jaune – sclérotiniose *Sclerotinia sclerotiorum*

Floraison – remplissage des graines – pourriture sèche du capitule *Rhizopus sp.*

Maïs

Avant le semis – pendant le semis – 6ème–7ème feuille – taupins de la famille des *Elateridae*

Germination – pourriture des semences et des plantules *Fusarium sp.*, *Aspergillus sp.*, *Nigrospora oryzae*

Levée – 5ème–7ème feuille – charançons (charançon gris du maïs *Tanymecus dilaticolis* et charançon gris de la betterave *Tanymecus palliatus*), noctuelles terricoles de la famille des *Noctuidae*

Dès le début de la végétation – pucerons *Aphis evonymi*, *Rhopalosiphum maidis*,

1ère–9ème feuille – *maladies virales* (mosaïque nanisante du maïs *Maize dwarf mosaic virus* et mosaïque striée du blé *Wheat streak mosaic virus*)

5ème–6ème feuille – floraison – charbon commun *Ustilago zeae*

6ème–8ème feuille – sortie des panicules – pyrale du maïs *Ostrinia nubilalis*, noctuelle de la tomate *Helicoverpa armigera*

Floraison – maturité laiteuse – pourriture de la tige *Fusarium sp.*, helminthosporiose *Helminthosporium turcicum*

Maturité laiteuse – pleine maturité – *fusariose de l'épi*

Colza

Cotylédons – formation de la rosette – altises des crucifères du genre *Phyllotreta* : altise noire du chou (*Phyllotreta atra* L.), altise à bandes ondulées (*Phyllotreta undulata* Kutsch.) et autres, altise du colza (*Psylliodes chrysocephala* L.), tenthrède du colza (*Athalia rosae* Christ.), chrysomèle du colza (*Entomoscelis adonidis* Pall.).

Montaison – formation des hampes florales - punaise ornée du chou (*Eurydema ornata* L.), punaise du chou (*Eurydema oleraceum* L.), piéride du chou (*Pieris brassicae* L.), piéride de la rave (*Pieris rapae* L.), noctuelle du

chou (*Mamestra brassicae* L.), charançons des siliques du genre *Ceutorhynchus*.

Formation des boutons – floraison – méligèthes (*Meligethes aeneus* F.), cétoine hérissée (*Tropinota hirta* Poda.), charançons des siliques du genre *Ceutorhynchus* : charançon de la tige du colza (*Ceutorhynchus napi* Gyll.), charançon de la tige du chou (*Ceutorhynchus pallidactylus* (Marsh.) (synonyme *Ceutorhynchus quadridens*).

Formation des siliques – charançon des siliques (*Ceutorhynchus assimilis* Payk.), puceron cendré du chou (*Brevicoryne brassicae* L.), cécidomyie des siliques (*Dasineura brassicae* Winn.).

Surveillez les cultures et intervenez en temps utile !