

Températures critiques pour les espèces de fruits à noyau à floraison précoce

Автор(и): Растителна защита
Дата: 16.03.2021 Брой: 3/2021



Les événements météorologiques de la fin de l'hiver, survenus à la fin de la première et au début de la deuxième décennie de mars, ont mis un terme aux processus de végétation des cultures d'automne dans une grande partie des régions de plaine du pays et ont sérieusement éprouvé les cultures fruitières plus avancées dans leur développement. Dans certains endroits de la plaine du Danube et dans les régions du sud (Plovdiv, Stara Zagora, Chirpan), des températures minimales allant jusqu'à -6 à -7°C ont été enregistrées, ce qui est critique pour certains arbres fruitiers entrés dans les stades du débourrement et de la floraison – amandier, abricotier et pêcher.

Pour la seconde moitié de mars, des températures minimales négatives sont prévues, avec un risque accru de dommages pour les espèces fruitières à noyau à floraison précoce.

Jusqu'à la fin de la deuxième décennie, les conditions agrométéorologiques seront très dynamiques. Après le bref réchauffement et la fonte des neiges à la mi-mars, des températures inférieures à la normale sont prévues pour la seconde moitié de la période, ce qui freinera le développement des cultures agricoles. Des exceptions sont attendues dans les régions les plus méridionales, où les températures moyennes journalières atteindront et dépasseront le minimum biologique requis pour la végétation des cultures céréalières d'hiver. À la fin de l'hiver, les peuplements de blé seront majoritairement au stade du tallage.

Au cours de la période à venir, des précipitations significatives sont attendues, ainsi qu'une augmentation des réserves en eau du sol dans la couche des 100 cm. Dans la plupart des régions de plaine, pour les cultures céréalières d'hiver, elles atteindront des niveaux supérieurs à 90% de la capacité au champ (CC).

Pendant cette période, les conditions seront inadaptées à la réalisation des travaux saisonniers de travail du sol et aux semis des cultures de printemps précoces et mi-précoces. La probabilité est élevée que les délais agrotechniques pour les semis de tournesol dans le sud de la Bulgarie, qui commencent à la mi-mars, ne soient pas respectés.

Source : INMH