

Début avril, une progression active des processus de végétation dans les cultures agricoles est observée.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.04.2021 Брой: 4/2021



Malgré les chutes de neige attendues en montagne et le refroidissement prévu début avril, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par des valeurs de température moyenne journalière qui permettront le cours actif des processus de végétation dans les cultures agricoles. Début avril, des températures minimales critiques pour les espèces fruitières avancées dans leur développement phénologique ne sont pas prévues.

Durant la période, le blé et l'orge dans le sud de la Bulgarie seront au stade de la montaison. Dans les cultures de la plaine du Danube, se produiront le tallage, la transition vers la montaison et le début de la montaison. Pour

les espèces fruitières, les phases phénologiques observées seront le débourrement, le bourgeonnement et la floraison. Dans la vigne, auront lieu l'écoulement de la sève et le gonflement des bourgeons.

Durant la période, des conditions seront créées pour réaliser les opérations agrotechniques saisonnières – semis du tournesol et préparations pré-semis du sol pour les cultures de printemps. Dans les cultures permanentes, les traitements se poursuivront contre la tavelure chez les espèces à pépins, contre la pourriture brune précoce (fleur brune) et la criblure chez les espèces à noyau, et contre la cloque du pêcher. Pour obtenir l'effet maximal des pulvérisations, les activités de protection des plantes doivent être réalisées par temps calme avec une vitesse de vent admissible allant jusqu'à 2–3 m/s.

Les précipitations prévues durant les premiers jours de la période limiteront temporairement les possibilités de réaliser les activités agrotechniques.

Source : INMH