

Il est temps de choisir un herbicide pour le colza

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.04.2021 Брой: 4/2021

Галера™
Супер
ХЕРБИЦИД



Супер хербицидът при рапица



Faites à nouveau confiance à Galera™ Super - L'herbicide de post-levée le plus large spectre contre les dicotylédones dans le colza

Chers collègues,

En raison de l'humidité normale du sol et des mois d'octobre, novembre et décembre 2020 relativement doux, les cultures de colza à travers le pays sont généralement au stade optimal pour l'hivernage. En raison de la période de végétation prolongée durant ces mois, les adventices ont également progressé dans leur développement, ce qui implique une application plus précoce des herbicides au printemps afin de libérer les cultures de la compétition avec les mauvaises herbes.

Galera™ Super est l'herbicide de post-levée le plus large spectre contre les dicotylédones dans le colza, contrôlant efficacement même les adventices dicotylédones les plus tenaces.

Galera™ Super contient trois substances actives issues de trois groupes chimiques différents, qui ont un effet complémentaire mutuel. Il s'applique de la deuxième feuille vraie jusqu'à neuf entre-nœuds formés ou plus, BBCH 12-39, aussi bien au printemps qu'en automne en présence d'adventices. Pour une efficacité optimale, une température minimale de 8°C – 10°C est requise.

Appliqué à la dose de 25 ml/are avec un volume de bouillie de 10-40 l/are dans le colza, **Galera™ Super** assure un excellent contrôle du bleuet, de la camomille, du chardon des champs, du liseron des champs, de la renouée des oiseaux, de l'amarante, du chénopode blanc, de la morelle noire, de la stellaire intermédiaire, du lamier pourpre, du coquelicot, du gaillet gratteron, du chardon-Marie, de la véronique, de la violette, du lamier pourpre, du coquelicot, de la bourse-à-pasteur, du tournesol volontaire, etc. Grâce à son activité complémentaire sur le sol, **Galera™ Super** contrôle les adventices à levée plus tardive.

En cas d'échec de la culture de colza traitée avec **Galera™ Super** pour quelque raison que ce soit – dégâts sur la culture dus au gel du sol, au gel, à une attaque de maladie ou de ravageur, il est possible sur la même parcelle de semer, au moins 1 mois après l'application et après un travail du sol de pré-semis (labour), de la moutarde, du chou à partir de plants, du blé ou du maïs.

Les avantages pratiques qui distinguent **Galera™ Super** sont :

- Il est absorbé simultanément par les feuilles et les racines et est transloqué dans toute la plante adventice
- Activité complémentaire sur le sol
- Fenêtre d'application large
- Efficace contre le tournesol et les pois volontaires
- Produit à trois composants avec des substances actives issues de trois groupes chimiques différents
- Herbicide systémique de post-levée sélectif
- Absorbé simultanément par les feuilles et les racines
- Absorption très rapide par les adventices – en 1 heure
- L'effet est visiblement plus rapide dans des conditions chaudes et humides
- Formulation liquide facile à appliquer – concentré soluble (SL)
- Peut être appliqué aussi bien en automne qu'au printemps
- Mode d'action différent des substances actives et effet complémentaire mutuel

