

Prévision agrométéorologique pour le mois d'avril

Автор(и): Растителна защита
Дата: 18.04.2021 Брой: 4/2021



Au cours de la première décade d'avril, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par des températures supérieures aux normes climatiques. Les conditions thermiques supérieures à la normale prévues accéléreront les processus de végétation des cultures céréalières d'hiver, et une grande partie des peuplements dans les zones de plein champ entrera massivement en phase d'élongation de la tige. Pour le colza, on observera le tallage et le début du stade du bouton floral.

Pendant la plupart des jours de la décade, des précipitations significatives ne sont pas attendues et les conditions dans de nombreuses régions du pays permettront la réalisation des travaux de préparation du sol avant semis et l'ensemencement du tournesol. La première décade d'avril est la date limite agrotechnique pour le semis du tournesol dans le nord de la Bulgarie.

À la fin de la première et au début de la deuxième décade, une baisse des températures, une stabilisation du temps et un changement substantiel des conditions agrométéorologiques sont prévus. Durant cette période, des précipitations significatives sont attendues ainsi qu'une augmentation des réserves en eau du sol, y compris dans la couche de deux mètres. Au début du printemps, dans la plupart des zones de plein champ, les réserves en eau du sol pour le blé dans la couche d'un mètre ont atteint des niveaux supérieurs à 90% de la capacité au champ. Des exceptions se produisent dans certaines régions orientales – postes agro-météorologiques de Razgrad, Dolni Chiflik, Sliven – où le niveau des réserves en eau est plus faible, en dessous de 80% de la capacité au champ.

À la fin de la première et au début de la deuxième décade d'avril, une stabilisation à court terme du temps et des conditions favorables sont prévues pour réaliser certains traitements phytosanitaires urgents dans les vergers : au stade du bouton floral chez les espèces à pépins (pommier, poirier) contre la tavelure ; des traitements post-floraison chez certaines espèces à noyau à floraison précoce contre la pourriture brune précoce des fleurs et la criblure ; chez le cerisier et le griottier contre la maladie fongique la plus dangereuse – la cylindrosporiose (appelée aussi rouille blanche), et autres.

Durant la deuxième décade d'avril, le développement des cultures agricoles se poursuivra à un rythme plus lent, sous des conditions thermiques inférieures à la normale. En fin de décade, une probabilité accrue de formation de gelées est prévue, ce qui doit être pris en compte lors de l'endurcissement des plants de légumes et de tabac. Les températures minimales prévues, atteignant par endroits moins 2–3°C, seront critiques pour les fleurs et les jeunes fruits des arbres fruitiers si elles persistent longtemps.

Au début de la troisième décennie, un réchauffement est attendu et dans les zones de plein champ, les températures du sol dans la couche de dix centimètres atteindront des valeurs favorables pour le semis du maïs grain.

Durant la troisième décennie, la végétation des cultures agricoles se poursuivra à un rythme modéré avec des températures proches des normes climatiques. Durant cette période, pour les céréales d'hiver, il y aura une transition de l'élongation de la tige vers l'épiaison et le stade de l'épiaison. Pour le colza, le stade de la floraison prédominera.

En avril, des précipitations fréquentes créeront des conditions favorables à l'augmentation du fond infectieux d'un certain nombre de maladies fongiques dans les vergers – pourriture brune précoce des fleurs, tavelure, criblure, cloque du pêcher, et autres. Des conditions plus favorables pour la réalisation des traitements phytosanitaires dans les cultures fruitières se présenteront pendant la plupart des jours de la première décennie et durant la première moitié de la troisième décennie.

Source : INMH