

Prévision agrométéorologique pour le mois de mai

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.05.2021 Брой: 5/2021



Cette année, la fraîcheur des températures durant la première moitié du printemps a retardé le développement des cultures agricoles. Durant la majeure partie du mois de mai, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps instable.

Les températures supérieures aux normales prévues en début mai accéléreront les processus végétatifs dans les peuplements semés à l'automne et les cultures de printemps semées. Durant la première décade, différentes phases se produiront pour le blé : montaison, transition vers l'épiaison, et épiaison. Pour l'orge dans les régions méridionales (Station Agrométéorologique de Sandanski), la phase de floraison sera observée. Pour le colza, auront lieu la floraison, la fécondation et la formation des siliques.

Après le temps chaud en début de mois, une normalisation des conditions thermiques est prévue pour la seconde moitié de la première décade. Les précipitations attendues durant cette période retarderont la mise en œuvre de certaines activités agrotechniques saisonnières – achèvement des semis de maïs grain, travail du sol présemis et semis des cultures thermophiles de printemps tardives (haricot, coton, arachide, etc.).

Durant les deuxième et troisième décades, le développement des cultures agricoles se poursuivra à un rythme modéré, avec des températures moyennes journalières proches des normes climatiques. *Les précipitations attendues dans la seconde moitié de mai maintiendront un très bon niveau de réserves hydriques dans les couches de sol à 50 cm et 100 cm, au-dessus de 85% de la capacité au champ (CC). Cela aura un effet bénéfique sur les cultures céréalières d'hiver, pour lesquelles la formation et le remplissage du grain seront en cours. Fin mai, dans une partie des peuplements de blé et d'orge des régions méridionales, le début du stade de maturité laiteuse sera observé.*

Durant le mois, la formation des feuilles se produira pour le maïs et le tournesol. Fin mai, pour le tournesol semé dans les délais agrotechniques, la formation de l'inflorescence sera observée.

Pour les cultures fruitières, la formation et l'agrandissement des fruits noués se produiront. Pour la vigne, l'émergence des inflorescences sera observée, et en fin de mois – le début de la floraison – ces stades sont critiques pour une infection par le mildiou.

Les précipitations fréquentes en mai créeront des conditions propices au développement d'un certain nombre de maladies cryptogamiques : rouilles (brune, jaune) et septorioses sur blé ; mildious sur les cultures maraîchères et la vigne ; brûlure florale, criblure et tavelure sur les arbres fruitiers, etc. Durant le mois, des conditions plus favorables pour la réalisation des traitements phytosanitaires interviendront en début de première décade, au milieu de la seconde et en début de troisième décade.

En mai, des températures minimales critiques pour les cultures agricoles ne sont pas prévues, mais la probabilité de grêle reste accrue. En cas de dégâts dus à la grêle, il est recommandé de traiter les cultures affectées à la première occasion avec des fongicides à base de cuivre pour une cicatrisation plus rapide des blessures et pour réduire le risque d'infections secondaires.

Source : NIMH