

Météo instable et probabilité accrue de grêle fin mai et début juin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.05.2021 *Брой:* 5/2021



La plupart des jours de la fin mai et du début juin, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps instable et des températures quotidiennes moyennes inférieures aux normes climatiques pour cette période.

Des précipitations d'importance agronomique sont prévues dans de nombreuses régions du pays. Dans les régions les plus à l'est, où les réserves en eau du sol dans la couche de 50 cm durant la seconde quinzaine de mai étaient les plus faibles, localement inférieures à 65% de la capacité au champ, comme aux stations agrométéorologiques de Sliven et Karnobat, une amélioration des réserves hydriques et des conditions pour le développement des cultures agricoles est attendue. Les précipitations de la période à venir seront d'une

importance majeure pour les cultures céréalières d'hiver, dans lesquelles le remplissage du grain aura lieu, et dans les régions du sud – également le stade de la maturité laiteuse. Durant la période allant du remplissage du grain à la maturité laiteuse, des dégâts importants sur le blé sont causés par les larves de la punaise des céréales, ce qui nécessite une surveillance des peuplements pour la présence du ravageur et, lorsque la densité de population dépasse le seuil économique de nuisibilité, qui est de 2 larves/m², un traitement insecticide doit être appliqué à la première occasion.

Durant cette période, la formation des feuilles aura lieu chez le maïs et le tournesol. Début juin, seule une petite partie des peuplements de tournesol, principalement ceux semés dans les délais agrotechniques, entrera dans le stade de formation de l'inflorescence.

Les précipitations fréquentes durant la période entraveront la réalisation des traitements phytosanitaires et créeront des conditions favorables au développement d'un certain nombre de maladies cryptogamiques : les mildious sur les cultures maraîchères et la vigne, la moniliose sur les fruits des variétés précoces de cerisier, la pourriture grise sur les fraises, la tavelure sur les arbres fruitiers, etc.

Pour la fin mai et le début juin, une probabilité accrue de grêle est à nouveau prévue, ce qui cause des dégâts importants aux cultures agricoles et des pertes sur la récolte fruitière des vergers actuellement en maturation.

Nous rappelons qu'hier, un orage de grêle dévastateur a détruit la production agricole dans plusieurs villages des municipalités de Sopot et Karlovo. Selon les estimations préliminaires, près de 70% de la production a été anéantie par la catastrophe. Les dégâts sur les plantations de rosiers, qui sont en phase de fructification, sont considérables.

Source : INMH