

Prévision agrométéorologique pour juin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.06.2021 Брой: 6/2021



Au cours de la première décennie de juin, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps instable. Au début du mois, des précipitations significatives sont prévues, améliorant les réserves en eau du sol dans les couches de 50 et 100 cm. Dans la majeure partie du pays, les réserves en eau du sol pour les cultures de printemps atteindront des niveaux allant jusqu'à, et dans la plaine du Danube – même au-dessus de 80-85% de la capacité au champ. L'humidité du sol restera plus faible dans certaines régions orientales et méridionales, où les précipitations de mai ont été inférieures, localement en dessous de 50-60% des normes mensuelles – G. Delchev, Sliven, St. Zagora, Varna, Karnobat, Burgas, Ahtopol.

Début juin, le développement des cultures agricoles se déroulera à un rythme plus lent, dans des conditions météorologiques fraîches pour la saison. Durant la première décennie, le remplissage des grains et le stade de la

maturité laiteuse interviendront pour le blé. À la fin de la décade, pour l'orge dans certains endroits des régions méridionales, la maturité cireuse sera également observée – Sandanski. Les averses limiteront les possibilités de réaliser les traitements phytosanitaires contre le mildiou de la vigne et des cultures maraîchères, la tavelure et la moniliose des arbres fruitiers, et contre la punaise des céréales dans les cultures céréalières d'hiver.

Durant la seconde moitié de la période, la probabilité de chutes de grêle et de précipitations locales subsiste, présentant un risque de dégâts pour les cultures agricoles. Le risque de verse dans les peuplements de blé et d'orge est élevé.

Durant la seconde décade, une amélioration et une normalisation des conditions thermiques sont prévues. Au cours de cette décade, l'orge achèvera son développement. Pour le colza, le stade de maturation interviendra.

Durant la troisième décade, le développement des cultures agricoles se déroulera sous des températures proches des normes climatiques. Durant cette période, pour le blé dans les régions de plaine, la maturité cireuse sera observée.

Fin juin, une partie des cultures de printemps entrera dans les stades reproductifs de son développement. Pour les hybrides précoces de maïs, le stade de l'épiaison sera observé, et pour le tournesol semé dans les délais agrotechniques – le début de la floraison.

La plupart des jours du mois, l'humidité atmosphérique élevée maintiendra des conditions favorables au développement d'un certain nombre de maladies cryptogamiques : tavelure, criblure et oïdium des arbres fruitiers ; mildious des cultures maraîchères et de la vigne, etc. Pour la vigne, la période interstade entre la floraison des inflorescences et la formation des grains de pois est critique pour les infections par le mildiou et l'oïdium. Des conditions plus propices à la réalisation des traitements phytosanitaires extrêmement importants se présenteront durant la première moitié de la seconde décade et durant la troisième décade de juin.

Tout au long du mois, la probabilité de chutes de grêle restera accrue. En cas de dégâts de grêle, il est conseillé de traiter les cultures fruitières et maraîchères affectées avec des fongicides à base de cuivre à la première occasion.