

Fin juin – fortes chaleurs et précipitations localisées

Автор(и): Растителна защита
Дата: 29.06.2021 *Брой:* 6/2021



Fin juin, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps chaud, et par endroits – chaud. Le développement des cultures agricoles sur la majeure partie des zones de plein champ se déroulera sous de bonnes à très bonnes réserves en eau dans les couches de sol de 50 et 100 cm (plus de 80–85% de la capacité au champ) suite aux précipitations significatives des deux dernières semaines, qui ont atteint par endroits dans le centre et l'est de la Bulgarie jusqu'à deux fois les normales de juin et plus (Veliko Tarnovo – 118 l/m², Ruse – 115 l/m², Razgrad – 108 l/m², Silistra – 116 l/m², Dobrich – 111 l/m², Karnobat – 96 l/m²). Des exceptions se produiront dans certaines régions de l'extrême ouest et du sud, où des précipitations inférieures à la normale ont été enregistrées et où les réserves en eau du sol au début de l'été sont insatisfaisantes pour les cultures de

printemps dans la couche de 50 cm – inférieures à 65% de la capacité au champ (stations agrométéorologiques : Bazovets, Kyustendil, Sandanski, Haskovo, Sliven).

Durant la période, le tournesol sera au stade de la formation de l'inflorescence. Début juillet, dans les cultures semées dans les délais agrotechniques, principalement dans les régions du sud, le début du stade de la floraison sera également observé.

Chez le maïs, la formation des feuilles se poursuivra. Pour les hybrides plus précoces, les stades de la sortie des panicules et de la floraison des panicules seront observés. Fin juin et début juillet, les cultures de maïs devront être inspectées pour détecter la présence de l'un des ravageurs les plus importants – la pyrale du maïs, et lorsque la densité du ravageur dépasse le seuil économique de nuisibilité, un traitement en temps opportun est impératif.

Les températures élevées prévues durant la dernière semaine de juin limiteront le développement d'un certain nombre de maladies fongiques, à l'exception des oïdiums.

Durant la prochaine période, le blé achèvera son développement, même dans les champs en altitude.

Durant la période, des précipitations localisées sont à nouveau prévues, avec une probabilité accrue dans l'est de la Bulgarie, où le début de la campagne de récolte sera entravé de manière supplémentaire.

Source : NIMH