

Le déficit d'humidité du sol en août sera un facteur limitant pour le développement des cultures agricoles.

Автор(и):

Дата: 09.08.2021 Брой: 8/2021



Après la chaleur prolongée de juillet, les premiers jours d'août continueront d'être marqués par des conditions agrométéorologiques sèches et chaudes. Les températures maximales extrêmement élevées prévues en début de mois, supérieures à 39-40°C, perturberont le cours normal des processus physiologiques des cultures agricoles. Des valeurs de cet ordre, combinées à une faible humidité de l'air, provoqueront de la stérilité dans les cultures maraîchères de pleine campagne tardives.

Début août, selon la précocité des variétés hybrides de maïs, on observera les phénophases laiteuse, pâteuse et pleine maturité. Chez le tournesol, se dérouleront les phases de développement et de maturation des graines. Pour la vigne, on observera la véraison et le ramollissement des baies. Dans de nombreuses régions du pays, les conditions limiteront les possibilités de travail du sol en raison du manque d'humidité. Il est conseillé d'effectuer un déchaumage sur les parcelles libérées du blé et de l'orge afin de détruire la végétation adventice, de briser les capillarités du sol et de préserver son humidité. Les conditions pour réaliser les traitements phytosanitaires sur les cultures maraîchères et les plantations pérennes existeront principalement le matin durant les heures fraîches de la journée. La probabilité de grêle et de dommages aux cultures agricoles demeure également.

En août, le facteur limitant pour le développement des cultures agricoles tardives sera le déficit en humidité du sol. Les précipitations inférieures à la normale prévues au cours du mois, dans le contexte de la sécheresse qui s'est installée fin juillet, n'auront pas de signification économique particulière, ce qui nécessitera l'application de doses d'irrigation accrues pour les cultures tardives. Début août, des besoins en irrigation plus importants seront nécessaires pour les cultures secondaires et les hybrides de maïs plus tardifs, en cours de formation et de remplissage du grain, ainsi que pour les variétés d'arbres fruitiers et les vignes plus tardives, en phase de grossissement des fruits.

Les conditions thermiques supérieures à la normale prévues pour le mois entraîneront un raccourcissement des périodes interphasiques dans le développement des cultures de pleine campagne tardives. Durant la première décennie, une partie des hybrides précoces de maïs achèvera son développement, et chez les mi-précoces, on observera la phase de maturité laiteuse. Pour le tournesol, dans la plaine du Danube et les régions du sud, la phase de maturation aura lieu. Au milieu de la deuxième décennie, une grande partie des peuplements de tournesol entrera en maturité technique. Durant la troisième décennie, la maturité pâteuse prédominera chez les hybrides de maïs mi-tardifs, et chez le soja, ce sera la phase de maturation.

Les conditions météorologiques d'août limiteront le développement d'un certain nombre de maladies fongiques, à l'exception des oïdiums sur les cultures maraîchères, les variétés d'arbres fruitiers tardives et la vigne. Les traitements phytosanitaires durant le mois doivent être effectués pendant les heures fraîches de la journée avec des produits ayant une durée avant récolte appropriée, en accord avec la période de maturation des cultures.

En août, le sol sec et compacté dans de nombreux endroits des régions de grande culture du pays gênera la réalisation qualitative des labours profonds et des préparations pré-semis des parcelles destinées aux semis de colza d'hiver.

Source : NIMH