

'Mineuse de la tomate'

Автор(и): Весела Шишкова, Главен редактор

Дата: 26.01.2014 Брой: 1/2014



Ces dernières années, un ravageur majeur des tomates a été la mineuse de la tomate (*Tuta absoluta*). Des dégâts sur les fruits sont observés même à des niveaux d'infestation relativement faibles. Le papillon attaque les plantes tout au long de la période de végétation – du stade plantule à la récolte, car il développe de nombreuses générations par an – 9 à 10 dans les serres chauffées et 4 à 5 en plein champ, qui se chevauchent.

Les papillons adultes sont actifs la nuit et se cachent parmi les feuilles pendant la journée. Les dégâts sont causés par les larves. Elles préfèrent principalement les feuilles et les tiges des plantes, mais elles attaquent aussi les fruits. Les signes de la présence du papillon dans la serre sont des mines courtes et larges sur les feuilles, dans lesquelles on peut voir des larves et des excréments sous forme de tas, généralement situés à une extrémité.

Stratégie de lutte contre le ravageur

La mineuse de la tomate est un ravageur extrêmement agressif, qui s'est propagé rapidement et a été détecté en 2011 dans 21 districts du pays. L'élaboration du Programme National de Mesures de Lutte contre la Mineuse de la Tomate *Tuta absoluta* est nécessaire afin de limiter les pertes et la propagation du ravageur dans le pays en définissant un ensemble de mesures de surveillance et de contrôle. Ce programme est destiné aux spécialistes – agronomes et agriculteurs – dans leurs activités de protection des plantes contre ce ravageur.

Pose de pièges à phéromones pour la détection précoce du ravageur et la mise en œuvre de mesures de contrôle en temps opportun. À faible densité de population, l'un des agents biologiques *Macrolophus pygmaeus* ou *Nesidiocoris tenuis* peut être introduit.

Produits phytosanitaires autorisés

Avant 150 EC - 25 ml/da, Alverde SC - 0.1%, Altacor WG - 8–12 g/da, Ampligo 150 ZC - 40 ml/da, Affirm 095 SG - 150 g/da, Voliam Targo 063 SC - 0.08%, Decis 2.5 EC - 0.05%, Decis 2.5 EC New - 0.05%, Confidor Energy OD - 0.08%, Coragen 20 SC - 14–20 ml/da, Lannate 20 SL - 125 ml/da, Lannate 25 WP - 100 g/da, Mospilan 20 SP - 0.02%, Neem Azal T/S - 0.3%, Picador 20 SL - 0.05%, Rapax - 100–200 ml/da, Sineis 480 SC - 10–25 ml/da (20–25 ml/100 l d'eau), Uarrant 20 SL - 50 ml et Hipo SP - 0.02%