

En septembre – un bon niveau de réserves en eau et des conditions favorables pour la réalisation des travaux saisonniers des champs

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.09.2022 Брой: 9/2022



Durant la première moitié de la première décade de septembre, les conditions agrométéorologiques resteront instables, avec des précipitations fréquentes qui maintiendront de bonnes réserves d'humidité dans les couches supérieures du sol sur la plupart des zones de culture. Les précipitations généralisées tombées durant la troisième décade d'août, dépassant en de nombreuses régions du pays 30-40 l/m² (Lom - 44 l/m², Oryahovo - 54 l/m², Knezha - 53 l/m², Plovdiv - 36 l/m², Kardzhali - 72 l/m², Chirpan - 67 l/m², Ahtopol - 60 l/m²), ont accru les réserves en eau du sol sur la couche de 50 cm. Ces précipitations sont arrivées tardivement pour une partie

des cultures de printemps conduites en sec, qui, en raison du déficit hydrique du sol, ont achevé prématurément leur végétation.

Durant la première décade et la majeure partie de la seconde décade de septembre, le développement des cultures agricoles tardives ayant surmonté les effets adverses de la sécheresse estivale se poursuivra à un rythme accéléré, sous des températures proches ou supérieures aux normes climatiques. Début septembre, le développement des hybrides de maïs mi-tardifs s'achèvera. Dans les hybrides tardifs, on observera le stade de maturité laiteuse, et au milieu du mois – le stade de maturité cireuse.

Au début de la seconde décade, des précipitations sont à nouveau prévues et un risque accru est attendu pour le développement d'agents pathogènes causant la pourriture des fruits mûrs et de la récolte de raisin en maturation - pourriture grise sur la vigne, moniliose tardive sur les fruits des variétés d'arbres fruitiers d'automne-hiver.

Durant le mois, des périodes de temps relativement sec et de conditions plus favorables pour réaliser les travaux des champs saisonniers : récolte du tournesol et des hybrides de maïs plus précoces, exécution du labour profond et du travail du sol de pré-semis des parcelles destinées aux semis de cultures d'hiver, et semis du colza d'hiver, sont attendues durant la seconde moitié de la première décade et la majeure partie de la seconde décade. Jusqu'à la fin de la seconde décade de septembre, les délais optimaux agrotechniques pour le semis du colza seront applicables.

Durant la troisième décade de septembre, une stabilisation du temps, une baisse substantielle des températures, et les changements transitionnels des conditions agrométéorologiques typiques de la fin de l'été et du début de l'automne sont prévus. Les précipitations attendues durant cette période fourniront l'humidité nécessaire à une levée normale des peuplements de colza d'hiver semés dans les délais agrotechniques.

Au stade de la levée, des dégâts sur le colza sont causés par l'altise d'hiver du colza (adultes) et la tenthrède du colza (fausses chenilles), ce qui nécessite de surveiller les peuplements levés pour la présence de ces ravageurs et, lorsque leur densité dépasse le seuil de nuisibilité économique (seuil pour l'altise d'hiver - 2 altises par m²; seuil pour la tenthrède - 2-3 fausses chenilles par m²), d'effectuer un traitement en temps opportun.

Aucune gelée n'est prévue dans les zones de culture d'ici fin septembre, ce qui fournira des conditions pour la formation d'une production supplémentaire à partir des cultures maraîchères de la production de plein champ tardive.

Source NIMH