

Fin septembre et début octobre, les conditions seront favorables au développement des agents pathogènes responsables de la pourriture dans la culture non récoltée.

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.09.2022 Брой: 9/2022*



En septembre, dans certains endroits des régions du sud (Haskovo, Pazardzhik, Chirpan, Karnobat, Plovdiv, Sandanski, Sliven, Burgas), des précipitations économiquement significatives de 15 à 20 l/m² sont tombées et ont fourni l'humidité nécessaire à la levée du colza d'hiver semé dans les délais agrotechniques.

Une amélioration des conditions agrométéorologiques est prévue en fin de mois. Pendant la période, les hybrides de maïs tardifs achèveront leur développement et atteindront leur pleine maturité. Chez les variétés

d'arbres fruitiers tardives et dans les vignobles, les processus de maturation se dérouleront à des températures proches des normes climatiques.

Pendant la période, aucune précipitation significative n'est attendue et les conditions permettront d'achever la récolte des cultures de printemps tardives, d'effectuer le travail du sol avant semis sur les surfaces destinées aux semis de blé et d'orge, et d'appliquer les engrais minéraux. Pendant la période, le délai agrotechnique pour le semis des cultures céréalières d'hiver dans les hauts champs et le Pré-Balkan commence. D'ici fin septembre, les conditions permettront de rattraper les retards dans les semis de colza d'hiver. La période est propice aux semis d'automne d'épinards et à l'établissement de nouvelles plantations de fraisiers.

Au début de la période, dans des endroits isolés des champs de bassin, la possibilité de formation de gel ne peut être exclue, ce qui nécessite la récolte en temps opportun des produits sensibles aux dégâts du gel.

Pendant la première semaine d'octobre, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps instable, et pendant la seconde moitié de la période – également par des températures inférieures à la normale. Les précipitations prévues dans la première semaine d'octobre retarderont le déblaiement des surfaces des cultures sarclées tardives. Le temps humide et frais au milieu de la première décade sera un prérequis au développement d'agents pathogènes causant des pourritures – la pourriture grise sur la récolte non ramassée des cépages de vin tardifs, et la moniliose tardive sur les fruits des variétés d'arbres fruitiers d'automne-hiver.

Les précipitations tombées fin septembre dans les régions du nord-ouest, dans une partie des régions du nord-est et dans le champ de Sofia, de l'ordre de 20 à 30 l/m² (N. selo, Vidin, Lom, Oryahovo, Sofia, V. Tarnovo, Dobrich), ont accru les réserves d'humidité dans les couches supérieures du sol. Au cours de la période suivante, en Bulgarie occidentale et dans les régions centrales, la probabilité de précipitations locales et intenses est à nouveau prévue, ce qui entravera la mise en œuvre du travail du sol avant semis sur les surfaces destinées aux semis de cultures d'automne. Des retards importants sont attendus pour les semis de colza d'hiver. Les conditions agrométéorologiques défavorables de la fin de l'été et du début de l'automne, la sécheresse et les précipitations intenses qui ont suivi, sont la raison pour laquelle, dans de nombreux endroits des régions de plaine, les délais agrotechniques de septembre pour les semis de colza – une culture exigeant une agronomie précise – n'ont pas été respectés. Début octobre, le délai agrotechnique pour les semis de blé dans le nord de la Bulgarie commence.

Source : NIMH