

Prévisions agrométéorologiques pour octobre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 12.10.2022 Брой: 10/2022



En octobre, les conditions agrométéorologiques seront dynamiques, avec des températures proches des normes climatiques et des précipitations supérieures aux normales mensuelles.

Durant les premiers jours d'octobre, des températures plus élevées que la normale pour la saison sont prévues, créant des conditions favorables à la formation d'un rendement supplémentaire pour les cultures légumières tardives, ainsi qu'à une augmentation de la teneur en sucre dans les fruits des variétés automnales d'arbres fruitiers et des cépages de vin tardifs.

Après ces températures supérieures à la normale, un refroidissement de courte durée et une normalisation des conditions thermiques sont prévus dans la seconde moitié de la première décade.

Durant la première décade d'octobre, des précipitations significatives sont attendues, ce qui entravera davantage les activités agrotechniques saisonnières. De meilleures conditions pour réaliser le travail du sol pré-semis et les semis des cultures d'hiver sont attendues durant la première moitié de la seconde décade et pendant la plupart des jours de la troisième décade.

La sécheresse et les précipitations importantes, voire intenses par endroits, qui ont suivi à la fin de l'été et au début de l'automne, sont la raison de l'absence des dates de semis optimales en septembre pour le colza d'hiver. Une part significative des surfaces prévues sera semée en octobre, après les délais agrotechniques. En raison de ces raisons objectives, il est probable que les peuplements de colza semés tardivement ne parviennent pas à former une rosette (7–8 feuilles) durant leur végétation automnale – phase durant laquelle les plantes hivernent avec succès.

Octobre est la période optimale pour les semis des cultures céréalières d'hiver. La première décade correspond au délai agrotechnique pour semer le blé dans le nord de la Bulgarie, du 15 au 25 octobre – dans le sud de la Bulgarie, et à la fin du mois – dans les zones le long de la côte de la mer Noire.

Durant le mois, les stades initiaux de végétation des cultures d'hiver semées se dérouleront à un rythme modéré, compte tenu de la présence de bonnes réserves d'humidité dans les couches supérieures du sol. Fin octobre, pour le blé, selon les dates de semis, on observera les stades de levée et de troisième feuille. Dans les peuplements semés le plus tôt, fin septembre et début octobre, le début du stade de tallage sera également observé. Pour le colza, la formation des feuilles prédominera.

Les conditions thermiques prévues en octobre, proches de la normale, sont un prérequis pour une augmentation de la population du campagnol des champs – l'un des ravageurs dangereux pour les cultures d'hiver. D'ici la fin du mois, les peuplements d'hiver doivent être inspectés pour détecter la présence du ravageur, et si sa densité dépasse le seuil économique de nuisibilité (2 colonies actives par décare), des mesures de protection des plantes en temps opportun sont nécessaires (appâts empoisonnés placés aux entrées des colonies).

À la fin octobre, les conditions permettront la mise en œuvre de certaines activités phytosanitaires dans les vergers. Les vergers de pommiers et de poiriers touchés par la tavelure, après la récolte, doivent être traités avec une solution d'urée à 5% pour réduire l'infection. Pour les espèces à noyau, après la chute massive des feuilles, un traitement avec une bouillie bordelaise à 2% est recommandé contre les agents responsables de la criblure, de la pourriture brune précoce et de la cloque du pêcher.

Source : NIMH