

La troisième décade d'octobre – un facteur limitant pour le développement des peuplements de cultures d'automne sera le manque d'humidité dans les couches supérieures du sol.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.10.2022 Брой: 10/2022



Durant la première moitié de la troisième décade d'octobre, les conditions agrométéorologiques continueront d'être déterminées par un temps sec et des températures supérieures aux normes climatiques.

Dans les peuplements de blé et d'orge semés au début du mois, les stades de germination, levée (stations agrométéorologiques de Novachene et Pavlikeni) et début de formation des feuilles auront lieu, et pour le colza d'hiver – la formation des feuilles. Dans de nombreuses régions du pays, le facteur limitant pour le

développement des peuplements de cultures d'automne sera le manque d'humidité dans les couches supérieures du sol. Durant la seconde moitié de la période, les fenêtres agrotechniques optimales pour le semis des cultures céréalières d'hiver le long de la côte de la mer Noire commenceront.

Le déficit des réserves en humidité du sol dans la couche arable entravera la bonne exécution du labour profond des chaumes, du travail du sol avant semis des parcelles, et du semis du blé et de l'orge.

Le temps sera propice à l'inspection des peuplements de céréales d'hiver pour surveiller l'apparition et l'activité nuisible de certains ravageurs – le campagnol commun, la chrysomèle des céréales, les mouches des céréales et les pucerons. Une attention particulière doit être portée aux zones où la monoculture est pratiquée.

Les conditions seront favorables à la réalisation d'activités phytosanitaires dans les cultures permanentes – élimination des branches sèches et des fruits momifiés, grattage des vieilles écorces fissurées, et traitement des espèces fruitières à pépins affectées par la tavelure avec une solution d'urée à 5% pour limiter l'infection.

Source : NIMH