

Prévision agrométéorologique pour novembre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.11.2022 Брой: 11/2022



Au cours de la première quinzaine de novembre, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps sec et des températures supérieures aux normes climatiques. Jusqu'au milieu du mois, le facteur limitant pour le développement des cultures d'automne semées continuera d'être le déficit en humidité du sol. Dans certaines parties des régions du sud et du sud-est (station agrométéorologique de Karnobat), la sécheresse qui en résultera mettra en doute la survie d'une partie des cultures germées et levées.

Fin octobre, le niveau des réserves en humidité du sol dans la couche de 50 et 100 cm était anormalement bas, dans de nombreux endroits du sud de la Bulgarie – en dessous de 40% de la capacité au champ (stations agrométéorologiques : Plovdiv, Pazardzhik, Sliven). Dans certaines parties des régions du sud-est (station agrométéorologique de Karnobat), il n'y avait aucune humidité dans toute la couche de sol d'un mètre.

Début novembre, la sécheresse limitera la réalisation des travaux saisonniers de préparation du sol et, dans certaines des parcelles, retardera les semis des cultures céréalières d'hiver au-delà des délais agrotechniques.

Au cours de la seconde quinzaine de novembre, les conditions agrométéorologiques subiront un changement. Du milieu de la deuxième à la mi-troisième décade, des précipitations sont prévues, ainsi qu'une amélioration des réserves en humidité du sol dans les couches supérieures et dans les conditions pour la progression des stades initiaux de végétation des cultures d'automne semées. Durant cette période, le développement des cultures céréalières d'hiver se déroulera à des températures journalières moyennes proches des normes climatiques pour la seconde moitié du mois.

Fin novembre, le blé et l'orge seront dans les phases de levée et de formation de la 1ère, 2ème et 3ème feuille. Pour une petite partie des cultures dans certains endroits des régions de la plaine danubienne (stations agrométéorologiques : Bazovets, Novachene, dans la région de Ruse), où les précipitations locales au début de l'automne ont assuré l'humidité nécessaire à la végétation initiale des cultures céréalières d'hiver, la phase de tallage sera également observée.

Aucune température minimale critique pour les cultures d'automne levées n'est prévue au cours du mois. Début novembre, l'inspection des cultures pour la présence de ravageurs – mouche mineuse du blé, mouches des céréales – doit se poursuivre, et là où leur densité dépasse le seuil économique de nuisibilité (pour les mouches des céréales le SEL est de 3–4 ind./m², pour la mouche mineuse du blé – plus de 3 larves/m²), un traitement en temps opportun doit être effectué.

Des conditions favorables pour la réalisation des pulvérisations de protection des plantes d'automne dans les vergers afin de limiter les infections de tavelure, de moniliose précoce, de criblure, de cloque du pêcher et d'autres pathogènes hivernants se produiront au cours de la première quinzaine de novembre, et pour la plantation des arbres fruitiers – au cours de la troisième décade.

Source : NIMH