

Décembre – portez une attention particulière aux activités phytosanitaires dans les cultures pérennes

Автор(и): Растителна защита

Дата: 07.12.2022 Брой: 12/2022



La plupart des jours de décembre, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps dynamique, avec l'alternance de courtes périodes de températures moyennes quotidiennes autour, en dessous et au-dessus des normes climatiques.

Au début du mois, l'humidité accrue des couches supérieures du sol limitera la mise en œuvre des travaux saisonniers de préparation des sols. Au milieu de la période, aucune précipitation n'est attendue, ce qui offrira une opportunité pour mener des activités phytosanitaires dans les cultures permanentes.

Le refroidissement survenu fin novembre a entraîné un ralentissement, et dans les champs plus élevés et le Pré-Balkan, où un manteau neigeux s'est formé, un arrêt des processus végétatifs dans les cultures semées en automne.

Un réchauffement des températures est prévu début décembre, mais leurs valeurs moyennes quotidiennes, à l'exception de certains endroits du sud de la Bulgarie et le long de la côte de la mer Noire, ne dépasseront pas le minimum biologique requis pour la végétation des cultures céréalières d'hiver.

Pendant le mois, dans la majeure partie du pays, les cultures semées en automne resteront dans un état de dormance relative. Des exceptions seront à nouveau observées dans les cultures des régions sud et sud-est à la fin de la première et pendant la première moitié de la deuxième décade. Durant cette période, des températures supérieures à la normale sont prévues, avec des valeurs maximales supérieures à 10–12°C et des conditions pour une végétation retardée des cultures céréalières d'hiver, mais un changement de l'état phénologique des cultures est peu probable.

Cette année, une part significative des cultures de blé hivernera à un stade initial de leur développement. La sécheresse pendant la première moitié de l'automne dans la majeure partie du pays a restreint et retardé la végétation des cultures céréalières d'hiver. Pour cette raison objective, les cultures entreront dans l'hiver dans différentes phases phénologiques : levée, 1–2–3 feuilles et début de tallage. Seule une petite partie des cultures de blé dans certains endroits de la plaine du Danube – la station agrométéorologique de Novachene et la région de Ruse – est en phase de tallage, stade auquel les cultures résistent le mieux aux conditions hivernales.

En décembre, les températures minimales prévues, jusqu'à moins 9–10°C, dans des conditions sans couverture neigeuse et avec une persistance plus prolongée, présenteront un risque pour les cultures céréalières d'hiver levées mais pas encore endurcies.

Les précipitations attendues au cours du mois, autour et au-dessus de la norme, augmenteront le niveau des réserves d'humidité dans la couche de sol de 50 et 100 cm. Après les précipitations généralisées de la seconde quinzaine de novembre, qui dans de nombreuses régions du pays ont dépassé 40–50 l/m², le déficit hydrique dans les cultures semées en automne a été surmonté.