

Conditions agro-météorologiques instables et dynamiques à la fin du mois de mars

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.03.2023 Брой: 3/2023



Fin mars, les conditions agrométéorologiques seront caractérisées par une dynamique accrue. Durant la première moitié de la période, des températures supérieures à la normale et une activation des processus de végétation dans les cultures d'automne et les plantations pérennes sont prévues. Pour le blé, le stade du tallage se produira à grande échelle. Par endroits dans la plaine du Danube et dans les régions du sud, le début du stade de la montaison sera également observé dans les céréales d'hiver (stations agrométéorologiques : Novachene, Silistra, Haskovo).

En fin de mois, les conditions agrométéorologiques subiront un changement substantiel. Durant les derniers jours de mars, elles seront déterminées par des températures inférieures aux normes climatiques, proches du

minimum biologique requis pour la végétation des cultures d'automne et des cultures de printemps semées. Dans les régions du nord-est et dans les hauts champs, une probabilité de précipitations, y compris de neige, est prévue, avec un risque de dommage pour les espèces à noyau entrées en floraison.

Les précipitations attendues durant la dernière semaine de mars amélioreront les réserves en eau du sol sur la couche de 50 cm. À la fin de la deuxième décennie de mars, dans certaines parties des régions du sud et de l'est, le niveau des réserves en eau du sol pour les céréales d'hiver sur les couches de 50 et 100 cm était faible pour le début de la période de végétation printanière, localement inférieur à 65% de la capacité au champ (CC). Des réserves relativement bonnes, supérieures à 85% de la CC, ont été enregistrées pour les cultures d'automne dans les régions du nord-ouest du pays (stations agrométéorologiques : Bazovets, Nikolaevo, Novachene, Borima).

Pendant la plupart des jours de la prochaine période, les prévisions de temps instable avec des précipitations fréquentes entraveront la réalisation des traitements phytosanitaires dans les vergers, les travaux de préparation des sols avant semis et les semis des cultures de printemps mi-précoces.

Au milieu de la troisième décennie de mars (25.03–05.04), débute la période agrotechnique pour le semis du tournesol dans la plaine du Danube.

Source : NIMH