

'Унивок® – une protection extraterrestre contre les maladies des céréales'

Автор(и): Corteva Agriscience™
Дата: 24.03.2023 Брой: 3/2023



„Извънземна“ защита от болести

Fongicide de **Corteva Agriscience™** avec une nouvelle substance active **Inatreq™ active**, un nouveau mode d'action et une nouvelle **formulation iQ-4**

UNIVOC® est un nouveau fongicide qui offre une action préventive, d'arrêt et curative exceptionnelle contre toutes les maladies économiquement importantes des cultures céréalières. C'est un fongicide bicomposant, doublement systémique, contenant du prothioconazole, l'un des triazoles les plus récents, à action systémique, éradicatrice et préventive visant à lutter contre les maladies des céréales, y compris les rouilles, les taches foliaires et les fusarioses, et la substance active entièrement nouvelle **Inatreq™ active** issue d'un nouveau groupe chimique et avec un nouveau mode d'action contre un large spectre de maladies, dont l'avantage le plus

significatif est qu'elle constitue la nouvelle référence contre les espèces de *Septoria* et un outil de gestion de la résistance contre ce pathogène. Les matières actives de **UNIVOC®** se complètent dans un effet dit synergique, offrant ainsi aux agriculteurs un nouvel outil pour contrôler toutes les maladies des cultures céréalières.

Унивок®
Inatreq^{active}
ФУНГИЦИД

НОВ!


Начин на действие

Инхибира митохондриалното дишане

Произведеното количество на аденозин трифосфат (АТР) е намалено и защото АТР е основния енергиен носител, който задвижва жизнените функции на клетките, ключови биопроцеси се нарушават, растежът се възпрепятства и губите умират.

Inatreq™ active est une molécule créée à partir de l'actinomycète *Streptomyces* et d'une fermentation ultérieure. Ce fait démontre l'effet favorable du produit sur l'environnement et sur les cultures.

UNIVOC® assure une excellente durée de protection, suffisante pour sauvegarder les cultures même sous la plus forte pression d'infection, combinée à un effet physiologique exprimé par une stimulation de la photosynthèse, un blocage de l'hormone éthylène formée dans la culture dans des conditions de stress, une stimulation de la formation des racines et, sur cette base, une aide à la culture pour réaliser son potentiel de rendement maximum et atteindre des paramètres de qualité de grain élevés.



Отличен в класа си

<i>Septoria tritici</i> Септория по листата	<i>Drechslera / Helminthosporium</i> Мрежести петна
	
<i>Puccinia striiformis</i> Жълта ръжда	<i>Erysiphe graminis</i> Брашнеста мана
	
<i>Puccinia recondita</i> Кафява ръжда	<i>Pseudocercospora</i> Базично пилине
	
<i>Fusarium spp.</i> Фузариум по класа	<i>Rhynchosporium secalis</i> Листен пригор
	

Унивок®
Inatreq active
ФУНГИЦИД

НОВ!

Selon les agriculteurs ayant utilisé **UNIVOC®** en 2022, le fongicide assure un excellent contrôle de l'oïdium, de la tache helminthosporienne, des fusarioses, du piétin-verse, de la rouille brune, de la rouille jaune, de la moisissure des neiges, de l'helminthosporiose précoce et de la septoriose. **UNIVOC®** est appliqué à une dose flexible selon le moment d'application, comme suit : T1 – 120 ml/da ; T2 – 130 ml/da et T3 pour la protection contre les fusarioses à une dose de 130 à 150 ml/da.

Grâce à son nouveau mode d'action, **UNIVOC®** ne présente aucune résistance croisée avec d'autres fongicides, ce qui en fait une nouvelle arme anti-résistance pour contrôler les maladies printanières des cultures céréalières.

UNIVOC® possède une formulation spéciale basée sur la technologie iQ-4 pour une meilleure adhésion et pénétration dans les parties végétales de la culture et pour une protection plus durable contre les pathogènes.

La technologie iQ-4 est une formulation nouvellement brevetée contenant un système d'adjuvants spécialement conçu.

Унивок®
Inatreq^{active}
ФУНГИЦИД

Продължителна и сигурна защита



До 6 седмици след третиране в
зависимост от условията



Нетретирана контрола



Унивок®

Les avantages incluent :

- Étalement et couverture améliorés sur la surface foliaire même à faibles volumes d'eau
- Pénétration et redistribution améliorées dans les tissus végétaux
- Assure 97,5 % de couverture des parties végétales
- Huit jours après le traitement, 90 % du produit est toujours présent sur les parties végétales
- Activité prolongée et fiable jusqu'à 6 semaines après le traitement, selon les conditions météorologiques